

PREENCHIMENTO LABIAL GUIADO POR ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE COM FISSURA LABIOPALATINA:UM RELATO DE CASO

Mota EEO*, Kichese ALR, Rege ICC, Macedo APN.

O objetivo desse trabalho será relatar um caso clínico através do detalhamento da técnica para redução de assimetrias labiais residuais, após cirurgia prévia reparadora de correção de fissura lábio palatina, através do uso de preenchedor intradérmico absorvível de ácido hialurônico guiado por ultrassonografia. Os lábios desempenham uma atribuição importante na estética facial. As fissuras palatinas são condições de anormalidade lábio-dento-facial provenientes de uma falha na fusão dos processos labiais e palatinos durante o desenvolvimento embrionário. Cada paciente com fissura labiopalatina tem uma anatomia única. Ao proporcionar uma visualização detalhada da anatomia e permitindo ajustes em tempo real, a ultrassonografia minimiza riscos e maximiza os resultados estéticos e funcionais. Pacientes com fissura labiopalatina frequentemente têm cicatrizes e alterações na estrutura do lábio e tecidos adjacentes. Paciente 54 anos, feoderma, sexo feminino compareceu a clínica com queixa de assimetria labial após três queiloplastias reparadoras de doença congênita. Foi realizado o mapeamento da vascularização arterial labial no pré-operatório. Na técnica dinâmica a abordagem ecográfica acontece em tempo real e todo o procedimento de injeção do produto é guiado pelo Modo B com Doppler. O plano correto foi confirmado através das imagens da ultrassonografia e a cada mudança de região para um novo incremento o transdutor confirmava a segurança da injeção. A volumização e redução das assimetrias nos lábios da paciente foi alcançada de forma segura e com previsibilidade considerável.



PREENCHIMENTO LABIAL GUIADO POR ULTRASSONOGRRAFIA EM PACIENTE COM FISSURA LABIOPALATINA: RELATO DE CASO



Mota EEO*, Kichese ALR

Instituto Kichese Goiânia- Goiás

ephigeniaemanuely23081991@gmail.com


INTRODUÇÃO

Os lábios desempenham uma atribuição importante na estética facial, conferindo dinamismo para o terço inferior, atratividade e beleza. Para pacientes que passaram por cirurgia cosmética de fissura labiopalatina, ter lábios bem delimitados e proporcionais à face é fundamental para sua saúde emocional. Embora o reparo cirúrgico das fissuras labiais seja essencial para corrigir a deformidade e a disfunção, podem ocorrer imperfeições estéticas residuais.

OBJETIVO

O presente relato de caso clínico teve por objetivo apresentar a técnica para redução de assimetrias labiais residuais em paciente portador de fissura labiopalatina, através do uso de preenchedor intradérmico absorvível de ácido hialurônico guiado por ultrassonografia, afim de resgatar a harmonia orofacial do paciente.

METODOLOGIA



CONCLUSÃO

- O uso de ultrassonografia para guiar o preenchimento labial em pacientes com fissura labiopalatina melhora a segurança e eficácia do procedimento.
- A ultrassonografia proporciona uma visualização detalhada da anatomia, permitindo ajustes em tempo real no trans-operatório.
- O preenchimento labial com ácido hialurônico é uma opção viável para correção de assimetrias residuais pós cirurgias corretivas.
- A paciente demonstrou um alto grau de satisfação com o procedimento realizado e teve sua autoestima reestabelecida.