

Redução da flacidez abdominal com Ácido Poli-L-Láctico: estudo de caso

Nogueira FBA*, Passos IPL, Sena TMF, Cruzeiro DCB, Avelar JB.

A flacidez abdominal é uma disfunção estética comum, especialmente após grandes alterações de peso, gestação ou como resultado do processo natural de envelhecimento. A busca por tratamentos eficazes e minimamente invasivos para melhorar a tonicidade da pele tem levado ao uso crescente de bioestimuladores, como o ácido poli-L-láctico (PLLA). O PLLA é conhecido por estimular a produção de colágeno, proporcionando uma melhora gradual na firmeza da pele.

O objetivo desse estudo é avaliar a eficácia do bioestimulador à base de PLLA no tratamento da flacidez abdominal, utilizando um relato de caso como base para a pesquisa.

O caso apresentado é de uma paciente do sexo feminino, 50 anos de idade, apresentando flacidez abdominal moderada a severa. Após a consulta inicial e planejamento do tratamento, foi realizado na paciente a aplicação de um frasco de Elleva® de 210mg preparado para 20ml de água para injeção e 4ml de anestésico lidocaína 2%, distribuídos em leques com retroinjeções de 0,5ml.

Após um período de 3 meses foi realizado um novo registro fotográfico e foi observado uma melhora significativa na firmeza e elasticidade da pele abdominal, com uma redução visível da flacidez no teste de pinçamento digital. A paciente reportou alta satisfação com os resultados e sem complicações ou efeitos adversos.

O estudo pretende fornecer evidências sobre a eficácia do PLLA como uma opção eficaz para o tratamento da flacidez abdominal, contribuindo para a prática clínica e oferecendo uma alternativa aos procedimentos cirúrgicos.



REDUÇÃO DA FLACIDEZ ABDOMINAL COM ÁCIDO POLI-L-LÁCTICO: ESTUDO DE CASO

Nogueira FBA*, Passos IPL, Sena TMF, Cruzeiro DCB, Avelar JB^{GoIânia, Goiás}

INTRODUÇÃO


A flacidez abdominal é uma disfunção estética comum, especialmente após grandes alterações de peso, gestação ou como resultado do processo natural de envelhecimento.

OBJETIVO

O presente relato de caso clínico teve por objetivo realizar o tratamento de flacidez da região abdominal com bioestimulador à base de PLLA.

METODOLOGIA

O caso apresentado é de uma paciente do sexo feminino, 50 anos de idade, apresentando flacidez abdominal moderada a severa. Após a consulta inicial e planejamento do tratamento, foi realizado na paciente a aplicação de um frasco de Elleva® de 210mg preparado para 20ml de água para injeção e 4ml de anestésico lidocaína 2%, distribuídos em leques com retroinjeções de 0,5ml.



- O registro fotográfico foi realizado após um período de 3 meses.
- Foi observado uma melhora significativa na firmeza e elasticidade da pele abdominal, com uma redução visível da flacidez no teste de pinçamento digital.



CONCLUSÃO

Conclui-se que o tratamento realizado com Ácido Poli-L-Láctico promoveu uma melhora na região abdominal da paciente. De forma geral é considerado uma excelente opção para casos de flacidez, contribuindo para a prática clínica e oferecendo uma alternativa aos procedimentos cirúrgicos.