

EPIDEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

¹ Livia Raquel Oliveira Seixas Sousa, ² Francisco Edson Alves do Nascimento Silva, ³

Marcelo Vítor de Paiva Amorim, ⁴ Luanne Eugênia Nunes

¹Graduanda em Farmácia pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB; ²Graduando em Farmácia pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB; ³Docente do Instituto de Ciências de Saúde da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira; ⁴Docente do Instituto de Ciências de Saúde da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Eixo temático: Inovação no Âmbito da Saúde Coletiva e Atenção à Saúde

E-mail do autor correspondente: liviaraquelseixas@gmail.com

RESUMO:

A tuberculose, causada pelo complexo *Mycobacterium tuberculosis*, é uma doença infecciosa que afeta diversos sistemas do corpo, sendo principalmente diagnosticada no sistema respiratório inferior. É um problema de saúde global que representa uma ameaça significativa, especialmente em pacientes imunocomprometidos. Este estudo objetivou avaliar a incidência de tuberculose no Maciço de Baturité, em indivíduos com faixa etária de 20 a 69 anos, no período entre 2019 e 2023. O estudo de natureza descritiva, retrospectiva e transversal, foi realizado a partir da coleta de dados obtidos por meio do Sistema de Informações de Agravos de Notificação do Sistema Único de Saúde (SINAN/SUS), acessados pela plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisados os 13 municípios que compõem a região do Maciço de Baturité. No período avaliado, foram notificados 209 casos de tuberculose, com o ano de 2023 apresentando maior índice de notificações, 26,3% (n=55). Os municípios de Aracoiaba e Baturité apresentaram o maior quantitativo de casos, 25,5% (n=45) e 19,1% (n=40), respectivamente. Ademais, Barreira e Ocara foram localidades que não apresentaram notificações. Na avaliação do perfil sociodemográfico, por meio de variáveis (sexo, raça, escolaridade e faixa etária), verificou-se que 67,9% (n=142) dos diagnósticos foram entre indivíduos do sexo masculino, 84,7% (n=177) foram notificados em pessoas pardas, 32,1% (n=67) entre indivíduos com ensino fundamental incompleto e 44,5% (n=93) com faixa etária entre 20 e 39 anos. Sobre as variáveis clínicas, 81,8% (n=171) foram de casos de tuberculose pulmonar e 62,7% (n=131) dos casos confirmados com diagnóstico laboratorial. Sobre o índice de cura, 63,6% (n=133) dos indivíduos foram considerados curados. O panorama da tuberculose apresentado na região, subsidiará à formulação de políticas públicas com ações específicas de prevenção e vigilância, mediante estratégias de conscientização, especialmente em áreas com maior incidência, visando a redução do contágio da enfermidade.

Palavras-chave: Tuberculose, DATASUS, Ceará.