

AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS MALIGNAS DE PRÓSTATA NO BRASIL E O SEU IMPACTO PSICOLÓGICO NO PACIENTE



16º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

uro-oncologia

11º SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL DE URO-ONCOLOGIA

RAYSSA CARVALHO DE ALMEIDA¹, VÂNIA LÚCIA MARQUES CARVALHO², PEDRO VYCTOR CARVALHO DE ALMEIDA³, GABRIEL BARROS ARAÚJO¹

¹ UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE), SÃO PAULO, SP, BRASIL; ² UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU (USTD), SÃO PAULO, SP, BRASIL; ³ PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUCSP), SÃO PAULO, SP, BRASIL

INTRODUÇÃO

O CÂNCER DE PRÓSTATA É COMUM EM HOMENS NO BRASIL, ESPECIALMENTE APÓS OS 60 ANOS. APESAR DA ALTA INCIDÊNCIA, O RASTREAMENTO NÃO É MAIS ROTINEIRO, SENDO RECOMENDADO APENAS COM SINTOMAS COMO DISÚRIA E HEMATÚRIA, PARA EVITAR EXAMES DESNECESSÁRIOS, MAS SENDO ESSENCIAL DIANTE DOS PRIMEIROS SINAIS. ALÉM DOS EFEITOS FÍSICOS, O CÂNCER AFETA O PSICOLÓGICO, DESTACANDO A IMPORTÂNCIA DE UM ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR.

OBJETIVOS

ANALISAR A INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS MALIGNAS DE PRÓSTATA NO BRASIL ENTRE 2014 E 2024, ALÉM DE BUSCAR AVALIAR O IMPACTO PSICOLÓGICO DA DOENÇA NOS PACIENTES, DESTACANDO A INFLUÊNCIA DO DIAGNÓSTICO E DO TRATAMENTO NA SAÚDE MENTAL E NA QUALIDADE DE VIDA DESSES INDIVÍDUOS.

MÉTODO

TRATA-SE DE UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO TRANSVERSAL BASEADO EM DADOS COLETADOS DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (DATASUS). PARA A BUSCA DOS DADOS, FORAM SELECIONADOS OS ANOS DE 2014 A 2024 E UTILIZOU-SE AS SEGUINTE VARIÁVEIS: REGIÃO, FAIXA ETÁRIA, TEMPO DE TRATAMENTO E ÓBITOS.


RESULTADOS

A INCIDÊNCIA DE CÂNCER DE PRÓSTATA NO BRASIL AUMENTOU DE 6.323 CASOS EM 2014 PARA 29.017 EM 2024. A REGIÃO SUDESTE TEVE O MAIOR NÚMERO, COM 147.201 CASOS NA ÚLTIMA DÉCADA, SEGUIDA PELO NORDESTE (71.458) E SUL (47.672). O ANO DE 2023 REGISTROU O MAIOR NÚMERO DE CASOS (46.696), COM AUMENTO EM TODAS AS REGIÕES. EMBORA OS DADOS NÃO MOSTREM UM CRESCIMENTO LINEAR, HOUE QUEDAS NOS ANOS DE 2020 E 2024, MAS COM INCIDÊNCIA AINDA ELEVADA. NO TOTAL, 295.153 CASOS FORAM REGISTRADOS, COM 153.076 HOMENS PASSANDO MAIS DE 60 DIAS EM TRATAMENTO. NO MESMO PERÍODO, OCORRERAM 33.274 ÓBITOS, SENDO O SUDESTE A REGIÃO COM MAIS MORTES (16.525), SEGUIDO PELO NORDESTE (7.151) E SUL (5.834). ALÉM DISSO, A FAIXA ETÁRIA MAIS AFETADA FOI DE 65 A 69 ANOS, COM 66.650 CASOS.

Tabela 1 - Incidência de neoplasia maligna da próstata no Brasil por região, de 2014 a 2023

Região	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total	Média
Norte	209	231	310	473	880	1450	1200	1383	1610	1762	9508	1729
Nordeste	1582	1849	2336	3225	6862	10520	7396	9264	10600	10856	64490	11725
Sudeste	2992	3364	3700	5431	13900	21027	17766	19355	22115	23330	132980	24178
Sul	1139	1308	1459	1960	4365	6756	5463	5683	6931	7823	42887	7798
Centro-Oeste	401	482	552	781	1604	2627	1936	2226	2737	2925	16271	2958
Total	6323	7234	8357	11870	27611	42380	33761	37911	43993	46696	266136	48388

Figura 1 - Duração do tratamento e óbitos por neoplasia maligna de próstata no Brasil (2014-2023)



CONCLUSÃO

A INCIDÊNCIA DE CÂNCER DE PRÓSTATA NO BRASIL AUMENTOU NA ÚLTIMA DÉCADA, SENDO MAIS COMUM EM HOMENS ACIMA DE 65 ANOS, REFORÇANDO A IDADE COMO FATOR DE RISCO (COSTA, 2014). MESMO COM AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, MUITOS PACIENTES ENFRENTAM TRATAMENTOS PROLONGADOS (≥ 60 DIAS), IMPACTANDO A QUALIDADE DE VIDA E O PROGNÓSTICO. O NÚMERO DE ÓBITOS DESTACA A NECESSIDADE DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTOS EFICAZES. ALÉM DISSO, O IMPACTO PSICOLÓGICO, ASSOCIADO À ANSIEDADE, DEPRESSÃO E EFEITOS ADVERSOS, COMO INCONTINÊNCIA URINÁRIA E DISFUNÇÃO ERÉTIL, AFETA A AUTOESTIMA (CHAMBERS ET AL., 2014; DOWNING ET AL., 2019). ASSIM, A ABORDAGEM DEVE INCLUIR SUPORTE PSICOLÓGICO E ESTRATÉGIAS MULTIDIMENSIONAIS.

REFERÊNCIAS

- VISTA DO ANÁLISE DOS INDICADORES DE NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA NO BRASIL ENTRE MARÇO DE 2023 A MARÇO DE 2024 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES. DISPONÍVEL EM: <[HTTPS://BJIHS.EMNUVENS.COM.BR/BJIHS/ARTICLE/VIEW/2258/2526](https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/2258/2526)>.
- ENDORSED BY. [S.L. S.N.]. DISPONÍVEL EM: <[HTTPS://WWW.PCFCA.ORG.AU/MEDIA/789912/UTS-IMPACCT-CAREMODELMENTWITHPROSTATECANCERONLINE.PDF](https://www.pcfca.org.au/media/789912/UTS-IMPACCT-CAREMODELMENTWITHPROSTATECANCERONLINE.PDF)>.
- DOWNING, A., WRIGHT, P., HOUNSOME, L., ET AL. (2019). "QUALITY OF LIFE IN MEN LIVING WITH ADVANCED AND LOCALISED PROSTATE CANCER IN THE UK: A POPULATION-BASED STUDY." THE LANCET ONCOLOGY, 20(6)
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. INFORMAÇÕES DE SAÚDE (TABNET) - DATASUS. DISPONÍVEL EM: <[HTTPS://DATASUS.SAUDE.GOV.BR/INFORMACOES-DE-SAUDE-TABNET/](https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/)>.