

ACADÊMICO - REVISÃO DE LITERATURA - ODONTOLOGIA ESTÉTICA E
RESTAURADORA

O USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL

Ana Julia Monteiro Conceição (anamonteirocon@gmail.com)

Melissa Kelly Senedin Azevedo Marques Santos (melissasantos@umc.br)

Introdução: O sorriso gengival é definido como a exposição excessiva de gengiva maxilar durante o sorriso, com exposição maior que 3 mm, caracterizada por alterações gengivais, musculares e dentárias, isso acaba gerando um problema estético, podendo influenciar de forma negativa na autoestima do paciente. **Objetivo:** Com o uso da toxina botulínica é possível realizar um procedimento menos invasivo e obter o resultado em alguns dias, sendo uma alternativa terapêutica para o tratamento do sorriso gengival. **Metodologia:** A temática é abordada por uma revisão de literatura, para a seleção de artigos, utilizou-se as bases de dados: PUBMED e Google Acadêmico. **Resultados:** Quando realizada por especialistas treinados e utilizando substâncias de qualidade, a aplicação de toxina botulínica é considerada segura e eficiente, oferecendo efeitos positivos com aparência natural. **Conclusão:** Existem vários métodos de tratamento para o sorriso gengival, porém considera pelos profissionais uma prática conservadora, com baixo índice de complicações e efeito praticamente imediato, contribuindo para satisfação do indivíduo.

Palavras-chave: sorriso gengival; toxina botulínica.