

EFICÁCIA E SEGURANÇA DO DUPILUMABE EM ASSOCIAÇÃO COM CORTIOESTEROIDES TÓPICOS PARA DERMATITE ATÓPICA PEDIÁTRICA

Harumi Uituke¹; Marina Ribas Losasso¹; Debora Fernanda Domingues¹; Natalia Yukari Fukase Valente Soares¹; Otávio Páfaro Silva¹; Karina Torres Pomini².

- 1- Discente da Graduação do curso de Medicina na Universidade de Marília, Marília, São Paulo.
- 2- Docente da Graduação do curso de Medicina na Universidade de Marília, Marília, São Paulo.

INTRODUÇÃO: A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória crônica comum em bebês e crianças, com início precoce e curso recorrente. Caracteriza-se por lesões cutâneas eczematosas acompanhadas de prurido intenso, afetando a qualidade de vida dos pacientes e familiares. As opções terapêuticas sistêmicas são limitadas, sendo o tratamento realizado com corticosteroides tópicos (TCS) e inibidores de calcineurina, que podem ser insuficientes em casos graves, evidenciando a necessidade de novas abordagens eficazes. **OBJETIVO:** Analisar a segurança e eficácia do uso de dupilumabe associado corticosteroides tópicos no tratamento de DA pediátrica. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura nas bases de dados PubMed/Medline, com os termos: “*corticosteroids and children and dermatitis and dupilumab*”. Dos 96 resultados iniciais, somente 3 ensaios clínicos randomizados controlados (ECR) foram analisados. **RESULTADOS:** Nos três ERCs a associação de dupilumabe com TCS, demonstrou eficácia e segurança em pacientes pediátricos com DA moderada a grave. Comparado ao uso de TCS com placebo, a terapia combinada resultou em proporções significativamente maiores de melhora clínica. A resposta clínica foi precoce e sustentada, sendo mais efetiva em doses ajustadas por peso. Os efeitos adversos mais frequentes foram conjuntivite e reações no local da injeção, geralmente leves e sem interrupção do tratamento. **DISCUSSÃO:** A consistência dos achados de segurança e a melhora clínica significativa, mesmo em casos refratários, destacam o benefício da inibição das vias de IL-4 e IL-13. A baixa gravidade dos efeitos adversos também reforça seu uso. **CONCLUSÕES:** A associação de dupilumabe com TCS demonstra-se uma estratégia terapêutica segura, eficaz e promissora no manejo da DA moderada a grave em crianças, promovendo alívio do prurido, melhora do sono, diminuição da dor cutânea e aprimoramento da qualidade de vida. **PALAVRAS-CHAVE:** Dermatite Atópica. Anticorpo Monoclonal. Corticosteroides.