

FÍSTULA SALIVAR EXTRA-ORAL DECORRENTE DE TRAUMA FACIAL POR ARMA BRANCA: RELATO DE CASO

ALOÍSIO FILIPE ARAÚJO MOREIRA¹, YASMIM NUNES MEDEIROS², JOSÉ EDUARDO PERCIANO DOS SANTOS³, SALVADOR DE OLIVERIA BRANDÃO NETO⁴ PAULO ALMEIDA JUNIOR⁵

¹Universidade Tiradentes – aloisio.filipe@souunit.com.br ²Universidade Tiradentes – yasmim.nmedeiros@souunit.com.br ³Universidade Tiradentes – jose.perciano@souunit.com.br ⁴Residente em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da ABO-SE – salvadorbrandao123@icloud.com ⁵Universidade Tiradentes – [paulo.almeida@souunit.com.br](mailto: paulo.almeida@souunit.com.br)

Introdução: A fistula salivar é uma complicação relacionada a traumas ou procedimentos que envolvem as glândulas e ductos salivares. Pode causar desconforto funcional, dor, infecção e comprometimento estético, tornando-se relevante seu diagnóstico e tratamento precoce. **Objetivo:** Este trabalho visa relatar um caso de fístula salivar extraoral decorrente de trauma por arma branca, enfatizando diagnóstico, conduta terapêutica e evolução clínica para melhor prognóstico e qualidade de vida. **Relato de caso:** Paciente masculino, 39 anos, ASA I, vítima de ferimento corto-contuso transfixante em região zigomática. No 7º DPO, apresentou xerostomia, aumento de volume extraoral espontâneo e saída de saliva pelo ferimento. Foi realizada recanalização do ducto de Stenon com sonda uretral nº 8 fixada intra-oral, associada a laserterapia, curativo compressivo, uso de kinesio tape e cicatrizante tópico. Observou-se melhora significativa do quadro de xerostomia e regressão do edema no 15º DPO. **Considerações finais:** A recanalização do ducto de Stenon associada a terapias adjuvantes mostrou-se eficaz para o fechamento da fístula salivar extraoral, com restabelecimento funcional e resolução completa em 45 dias de preservação.

Palavras-chave: Fístula das Glândulas Salivares; Traumatismos do Nervo Facial; Ductos Salivares.