

TRABALHOS CIENTÍFICOS - TRABALHOS CIENTÍFICOS

REMANESCENTE DO SEIO UROGENITAL, UM RELATO DE CASO

Maria Queiroz Santos (ialiaqs@gmail.com)

Paulo Marcelo Pires Bastos (pmarcelo_pires@hotmail.com)

Leila Maria Farias Cirino Gonçalves (leilacgon@gmail.com)

Ariane Sampaio (anesampaio@hotmail.com)

Ana Paula Da Hora Paz Santos (Anadahora@gmail.com)

Joao Paulo Schaeff Pereira Soares (jpschaeff@hotmail.com)

Candida Penna Teixeira (dadipen@gmail.com)

Ana Carina Oliveira Guirra (anacarinaguirra@gmail.com)

Marcella Araújo Pires Bastos (marcellaaraujo99@gmail.com)

Introdução: A persistência do seio urogenital é uma malformação rara do trato genital e urinário inferior, decorrente de falhas no desenvolvimento embrionário da região urogenital durante o período fetal. Esta condição pode estar associada a duplicação uretral, anomalias do trato genital, fístulas e alterações renais. Na presença da lesão, excluindo outras malformações, estamos diante do remanescente do seio urogenital, esta ainda mais rara.

Objetivo: Relatar caso de remanescente do seio urogenital em lactente, destacando diagnóstico, abordagem cirúrgica e seguimento pós-operatório.

Relato de Caso: Lactente feminina apresentou lesão vegetante em grande lábio direito, que se estendia até parede vaginal e fúrcula ipsilateral, identificada no período neonatal, sem saída de secreções. Investigação complementar evidenciou cariótipo 46,XX e ultrassonografia de rins e vias urinárias sem alterações. Paciente foi acompanhada ambulatorialmente até a idade adequada para procedimento cirúrgico. Realizada cistoscopia pré-operatória, a qual evidenciou a presença anatômica de vagina e uretra, com seus respectivos orifícios, afastando-se assim a persistência do seio urogenital. Procedida a ressecção de lesão em grande lábio e vaginal a direita com genitoplastia e vaginoplastia em tempo único. Anatomia patológica confirmou remanescente do seio urogenital. Lactente apresentou evolução pós-operatória sem intercorrências.

Discussão: O remanescente do seio urogenital é uma patologia rara que indo de encontro a persistência do seio urogenital que frequentemente associada a malformações geniturinárias, não apresenta outras alterações do trato geniturinário quando submetidas a investigação diagnóstica. No caso relatado, o diagnóstico firmado do remanescente do seio urogenital possibilitou abordagem cirúrgica simples, baseada na exérese da lesão e vaginoplastia e genitoplastia em tempo único. Terapêutica não indicada nos casos de persistência do seio urogenital, o qual exige uma abordagem mais complexa, havendo muitas vezes a necessidade de uma correção que envolve mobilização do seio urogenital e genitoplastia feminizante, especialmente em condições intersexuais ou hiperplasia adrenal congênita.

Conclusão: Este caso demonstra um diagnóstico raro, geralmente através da exclusão de outras anomalias associadas, bem como um alto grau de suspeição. A partir daí, pode ser realizado um planejamento cirúrgico individualizado, assegurando resultados funcionais e estéticos satisfatórios.

Palavras-chave: remanescente seio urogenital; persistência do seio urogenital; genitoplastia.