# COROAS DE ACETATO COMO ALTERNATIVA RESTAURADORA EM DENTES DECÍDUOS ANTERIORES COM HIPOPLASIA DE ESMALTE: RELATO DE CASO

Lesly Eduarda da Silva Cândido[1](leslycandido0@gmail.com)
Ana Larissa Rocha Soares[1](dralarissars@gmail.com)
Gleycianne Taumaturgo Mota[1](glayciannet123@gmail.com)
Francisco Avelar Gomes da Silva Júnior[2](avelargomes.38@gmail.com)
Maria Alcineide Dias Araújo[2](alcineide.d.araujo@gmail.com)

**INTRODUÇÃO**: A hipoplasia de esmalte caracteriza-se pela formação deficiente ou ausência parcial do tecido, comprometendo a estrutura dentária. Em dentes decíduos anteriores, essa alteração pode prejudicar a estética, a função mastigatória e a qualidade de vida da criança. Nesse contexto, torna-se fundamental o uso de técnicas restauradoras que conciliem estética e função, destacando-se as coroas de acetato como uma alternativa viável para a reabilitação desses elementos. **OBJETIVO**: Relatar a reabilitação de dentes decíduos anteriores com hipoplasia de esmalte utilizando coroas de acetato. **MÉTODOS**: Paciente de 4 anos, recebeu atendimento no Centro Universitário INTA, em Sobral-Ceará. No exame clínico, constatou-se ausência de esmalte na região palatina dos incisivos superiores, sendo aplicadas coroas de acetato como forma de tratamento. Para isso, as etapas realizadas foram: Profilaxia; seleção e ajustes das coroas; isolamento relativo; condicionamento ácido seguido da aplicação do sistema adesivo em todas as faces, volatização e fotoativação; preenchimento das coroas com resina composta e adaptação aos remanescentes dentários; remoção do excesso de material; fotoativação; remoção das matrizes; acabamento e polimento. **RESULTADOS**: A reabilitação utilizando coroas de acetato proporcionou cobertura adequada das áreas afetadas, restabelecendo a anatomia, e devolvendo função e estética aos elementos dentários. Observou-se adaptação adequada das coroas, boa retenção do material restaurador, preservação da saúde gengival, conforto durante o procedimento, além de satisfação da criança e familiares. **CONCLUSÃO**: As coroas de acetato se mostraram como uma técnica restauradora eficaz e minimamente invasiva para dentes decíduos anteriores com hipoplasia de esmalte, conciliando estética, função e bem-estar emocional, sendo uma alternativa viável para a reabilitação clínica em pacientes pediátricos.

**Descritores**: Hipoplasia do Esmalte Dentário, Odontopediatria, Coroas.