

RESUMO SIMPLES ESTRUTURADO - ESTUDOS EXPERIMENTAIS E DE
REVISÃO- METODOLOGIAS DE REVISÕES SISTEMÁTICAS,
INTEGRATIVAS, METAANÁLISE E MODELOS EXPERIMENTAIS EM
PESQUISA BIOMÉDICA.

**FONOAUDIOLOGIA NOS TRANSTORNOS DO MOVIMENTO: UMA
REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA**

Ludmila Tavares Dos Santos (ludmilatavaris@gmail.com)

Francisco Ramon Tavares Xavier (franciscoramontavaresxavier@gmail.com)

Maria Rosilene Do Nascimento (mrosileny654@gmail.com)

Márcia Rejane Freire De Oliveira (marciafreoli@gmail.com)

Os transtornos de movimento ou distúrbios de movimento referem-se a um grupo de condições neurológicas que afetam a capacidade de realizar movimentos voluntários do corpo. São divididos em: síndromes hipocinéticas (síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo) e as hipercinéticas, que incluem coreia, distonia, mioclonia, tiques, tremor e discinesia. Esses transtornos ocasionam ainda alterações na deglutição, transtornos na fala, falhas na marcha e instabilidade postural. O presente estudo buscou identificar as manifestações mais prevalentes nos transtornos do movimento e as possibilidades de atuação do Fonoaudiólogo. Realizou-se uma revisão narrativa da literatura de estudos sobre os transtornos do movimento publicados nos últimos cinco anos. Utilizamos as bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico. Foram incluídos 41 artigos disponíveis na íntegra. As condições mais comuns relatadas foram parkinsonismo (36%), distonia (24,9%)

e tremor (13,8%), sendo menos comuns tics (6,6%), coreia (2,9%), síndromes tardias (3%), mioclonia (2,4%), espasmo hemifacial (1,7%), ataxia (1,8%), discinesia paroxística (1,1%), estereotipias (0,6%), síndrome das pernas inquietas (1,9%), síndrome da pessoa rígida (0,2%) e transtornos neurológicos funcionais (0,3%). Em virtude do processo de envelhecimento observado na população brasileira, espera-se que a prevalência dos transtornos do movimento torne-se mais elevada. A terapia fonoaudiológica auxilia na maximização da comunicação funcional do paciente, manutenção da inteligibilidade da fala, possibilitando a inserção social, bem como, garantir o estado nutricional, a hidratação e as condições pulmonares. Os transtornos de movimento requerem atenção terapêutica, como as intervenções fonoaudiológicas, que são importantes para a reabilitação, ampliando cada vez mais sua atuação, promovendo uma melhor qualidade de vida para o paciente.

Palavras-chave: transtorno do movimento; fonoaudiologia; reabilitação; deglutição; fala.