

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Linha: A - Monitoria/ensino

Sarah Marinho Pereira Paiva¹; Luana Carolina Soares de Oliveira²; Glória Maria Rodrigues Deodato³; Maria do Socorro de Sousa Marques⁴

¹²³⁴Afya Paraíba, João Pessoa - PB

RESUMO

Introdução: O Descolamento Prematuro de Placenta (DPP) é uma complicação obstétrica grave que eleva a morbidade e mortalidade materna e neonatal. Portanto, a identificação dos seus fatores de risco é de extrema importância para a prevenção e o manejo adequados. **Objetivo:** Explorar a literatura científica acerca dos fatores de risco associados ao descolamento prematuro de placenta. **Métodos:** O presente estudo é uma revisão integrativa da literatura, tendo como estratégia de busca a utilização dos descritores cadastrados no DeCS/MeSH: “placental abruption” e “risk factors”, combinados com o operador booleano AND, com pesquisa nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); e PubMed, no período de 2020-2025. **Resultados e discussão:** Após análise dos critérios de exclusão e inclusão, selecionou-se 7 artigos da BVS, 7 da PubMed e 0 da LILACS, totalizando 14 artigos, dentre eles, 7 estavam repetidos. Restaram 7 artigos, com texto completo, em português, inglês ou espanhol, publicados entre 2020-2025, que atendiam ao tema. Foram identificados múltiplos fatores de risco para o DPP. Entre os fatores maternos estão incluídos diversos fatores, como: idade igual ou superior a 35 anos, tabagismo, consumo de álcool, baixo índice de massa corporal, raça negra, pré-natal inadequado, gestação múltipla, multiparidade, anemia e cesárea prévia, sendo o histórico de DPP prévio o principal fator de risco nesta categoria. Além disso, entre as complicações durante a gestação que predisõem o DPP estão: pré-eclâmpsia, polidrâmnio, ruptura prematura de membranas e hipertensão gestacional, com a placenta prévia representando o fator de maior risco entre essas complicações. **Considerações Finais:** A identificação de gestantes com fatores de risco para DPP é essencial para intensificar a vigilância pré-natal e otimizar o manejo. Pesquisas contínuas são necessárias para melhor compreender as interações entre esses fatores e desenvolver estratégias preventivas mais eficazes.

Palavras-Chave: Descolamento Prematuro de Placenta. Fatores de Risco. Gravidez