

FRENECTOMIA LINGUAL EM PACIENTE ADULTO COM ANQUILOGLOSSIA GRAVE: RELATO DE CASO

Ana Beatriz Do Valle Pereira Faria dos Santos

Graduanda em Odontologia

Instituição: Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO)

E-mail: ana.santtos30@hotmail.com

Lindeberg Henrique Rocha

Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

Instituição: Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO)

E-mail: linden-berg@hotmail.com

RESUMO

A anquiloglossia é uma anomalia congênita caracterizada pelo encurtamento do frênulo lingual, estrutura embrionária que inicialmente conecta a língua ao assoalho bucal. Tal alteração pode limitar a mobilidade lingual e comprometer funções como fala e deglutição, além de influenciar a morfologia oclusal. A avaliação funcional pode ser realizada pelo Protocolo Bristol (BTAT), instrumento que mensura objetivamente a fixação frenular e a amplitude dos movimentos da língua. Embora quadros graves sejam menos frequentes em adultos, o diagnóstico adequado e o conhecimento anatômico são essenciais para o planejamento terapêutico, especialmente quando se indica intervenção cirúrgica. O presente trabalho apresenta um estudo observacional descritivo do tipo relato de caso de anquiloglossia grave em paciente adulta, enfatizando a utilização do BTAT e a efetividade da frenectomia lingual. A avaliação clínica compreendeu anamnese, exame extra e intraoral e aplicação do BTAT, que confirmou limitação funcional significativa. A intervenção cirúrgica incluiu antissepsia extra e intraoral com Digliconato de Clorexidina, anestesia tópica, local e infiltrativa, tração lingual com fio de seda 4-0, incisões com lâmina 15C, divulsão das fibras e sutura de pontos simples. No pós-operatório imediato, já

verificou-se melhora da elevação lingual, e, após dez dias, observou-se cicatrização adequada, ausência de edema ou infecção e ampliação significativa da mobilidade da língua. A paciente relatou melhora perceptível da fala e da deglutição. Com isso, os resultados demonstram a efetividade do BTAT na identificação da anquiloglossia em adultos e confirmam a frenectomia lingual como procedimento seguro e resolutivo, contribuindo para o restabelecimento funcional e a qualidade de vida.

Palavras-chaves: frenectomia; anquiloglossia; cirurgia; Protocolo Bristol.