

RODAS DE CONVERSAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA E REDES DE CUIDADO NO
SUS PAULISTA

**ROSALINDTEST® COMO FERRAMENTA COMPLEMENTAR À
MAMOGRAFIA NO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA: UMA SÉRIE
DE CASOS**

Janaina Pereira Dina Toreli (janaina.toreli@santamarcelina.edu.br)

Fernando Luiz Affonso Fonseca (prof.ferfonseca@gmail.com)

Glaucia Raquel Luciano Da Veiga (grlveiga@gmail.com)

Matheus Rocha Do Vale (Matheus.rocha@gmail.com)

João Gonçalves (joao.goncalves@gmail.com)

César Eduardo Fernandes (cesar.fernandes@gmail.com)

Juliana Lana Rodrigues De Araújo (juliana.rodrigues@gmail.com)

Isabela Dudjak Rosa Trufelli (Isabela.trufelli@gmail.com)

Beatriz Da Costa Aguiar Alves Reis (bcaalves@uol.com.br)

O câncer de mama é frequentemente diagnosticado em estágios avançados no Brasil, refletindo limitações do rastreamento mamográfico e atrasos diagnósticos. Biomarcadores moleculares obtidos por biópsia líquida surgem como ferramentas complementares para a detecção precoce. Este estudo avaliou a concordância entre a expressão do RosalindTest®, realizada em sangue periférico, e achados de imagem e histopatológicos em mulheres submetidas ao screening de câncer de mama. Trata-se de uma série de casos

com cinco mulheres avaliadas por mamografia, ultrassonografia e/ou ressonância magnética, com classificação BI-RADS e biópsia quando indicada. Observou-se concordância entre os resultados moleculares e os achados histopatológicos: lesões benignas apresentaram baixa expressão, já casos de maior risco ou malignidade mostraram valores elevados. Os resultados sugerem que o RosalindTest® é uma ferramenta complementar promissora, capaz de apoiar a estratificação diagnóstica e a decisões clínicas.

Palavras-chave: câncer de mama; programa de rastreamento diagnóstico; biomarcador; diagnóstico precoce.