

RESUMO - 09: TECIDOS

TECIDOS E TÉCNICAS EM NEOVAGINOPLASTIA: AVALIAÇÃO DAS OPÇÕES CIRÚRGICAS E SEUS BENEFÍCIOS

Yasmim Farias De Miranda (yasmimfarias344@gmail.com)

Maria Evania Silva Amorim (draevania@gmail.com)

INTRODUÇÃO: A neovaginoplastia consiste na criação cirúrgica de uma vagina funcional em mulheres com sua ausência, como na síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser ou com estenose vaginal, possuindo como um dos objetivos o intercuro sexual pleno e satisfatório. **OBJETIVO:** Analisar na literatura as principais técnicas cirúrgicas e materiais teciduais utilizados em neovaginoplastias, elencando seus benefícios. **METODOLOGIA:** Revisão integrativa da literatura a partir de estudos disponíveis nos bancos de dados digitais PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando os descritores “Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser”, “Neovaginoplastia” e “Síndrome”, combinados com o operador booleano “AND”, tendo sido encontrados 35 publicações. Após critérios de inclusão: artigos completos publicados em português e inglês, no recorte temporal dos últimos 10 anos, e com critérios de exclusão: estudos indisponíveis na íntegra, o corpus final para análise foi de 5 estudos. **RESULTADOS:** Os estudos demonstram que as principais técnicas cirúrgicas utilizadas são de Davydov e McIndoe, as quais se utilizam de peritônio pélvico autólogo e pele de revestimento, respectivamente. A de Davydov é menos invasiva, tem menor risco de aderências intraperitoneais e o uso do peritônio gera menos complicações. A de McIndoe permite o uso de amnio, vantajoso por ser fisiológico, não gerar rejeição imunológica e ter

propriedades antimicrobianas; e pele de tilápia do Nilo, que possui microbiota não infecciosa e morfologia semelhante à pele humana. Ambas obtiveram comprimento vaginal de 7 a 8 cm com o auxílio do molde vaginal utilizado no pós-cirúrgico por, no mínimo, 12 meses. CONCLUSÃO: As técnicas apresentam-se como eficazes e seguras, gerando satisfação sexual das mulheres submetidas à neovaginoplastia.

Palavras-chave: relação sexual síndrome vagina cirurgia.