

RESUMO SIMPLES - REABILITAÇÃO E DESEMPENHO FUNCIONAL

**COMPARAÇÃO ENTRE CIVIQ-14 E PGI QUANTO À ASSOCIAÇÃO COM
VARIÁVEIS FÍSICAS E FUNCIONAIS EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA
VENOSA CRÔNICA**

Maria Vitória Rodrigues Souza (vitoria.rodrigues@ufvjm.edu.br)

Dalyla Silva Lemos De Souza (dalyla.silva@ufvjm.edu.br)

Vívian Camargo Chaves (vivian.camargo@ufvjm.edu.br)

Marina Silva Reis (Marina.reis@ufvjm.edu.br)

Antonielly Rocha De Souza Pereira (antonielly.rocha@ufvjm.edu.br)

Keity Lamary Souza Silva (Keity.lamary@ufvjm.edu.br)

Stefânia Guimarães Nery (Stefania.guimaraes@ufvjm.edu.br)

Iane Renata Carvalhais Mesquita (iane.carvalhais@ufvjm.edu.br)

Iany Pimenta Figueiredo (iany.pimenta@ufvjm.edu.br)

Gustavo Reis Maciel (gustavo.reis@ufvjm.edu.br)

Danielle Rayssa Araujo Medeiros (danielle.araujo@ufvjm.edu.br)

Fabício Pinho Madureira (fabriciomadureira@hotmail.com)

Vanessa Pereira De Lima (Vanessa.lima@ufvjm.edu.br)

Pedro Henrique Scheidt Figueiredo (pedro.figueiredo@ufvjm.edu.br)

Henrique Silveira Costa (henrique.costa@ufvjm.edu.br)

Introdução: A insuficiência venosa crônica (IVC) compromete a qualidade de vida e a funcionalidade dos pacientes, com impacto na mobilidade e na capacidade funcional. Diferentes questionários podem ser utilizados para avaliar a qualidade de vida, porém, sua relação com desfechos físicos e funcionais pode variar. O CIVIQ-14 contém perguntas mais direcionadas à condição venosa, enquanto o PGI apresenta caráter mais geral. **Objetivos:** Comparar os questionários CIVIQ-14 e PGI quanto à associação com variáveis físicas e funcionais em pacientes com insuficiência venosa crônica, a fim de identificar qual instrumento melhor reflete aspectos funcionais dessa população. **Métodos:** Estudo observacional com 21 pacientes com IVC ($61 \pm 13,29$ anos), classificados entre CEAP 1 e 5. A amostra foi composta por 20 mulheres (95,2%). Foram aplicados os questionários CIVIQ-14 e PGI, além de avaliações físicas e funcionais, incluindo amplitude de movimento em dorsiflexão pelo Weight-Bearing Lunge Test (WBLT), Perfil de Atividade Humana, Teste de Sentar e Levantar de 60 segundos (TSL60), teste da ponta do pé, perimetria da panturrilha e arco plantar. As associações foram analisadas por correlação. **Resultados:** O CIVIQ-14 apresentou correlação com variáveis funcionais: dorsiflexão pelo WBLT ($r = -0,510$; $p = 0,022$), Perfil de Atividade Humana ($r = -0,610$; $p = 0,006$), Teste de Sentar e Levantar de 60 segundos (TSL60) ($r = -0,552$; $p = 0,012$) e teste da ponta do pé ($r = -0,596$; $p = 0,006$). Já o PGI correlacionou-se com perimetria da panturrilha ($r = -0,478$; $p = 0,029$) e arco plantar ($r = -0,525$; $p = 0,015$), sem correlação com variáveis funcionais. **Conclusão:** O CIVIQ-14 apresentou associações mais consistentes com variáveis funcionais em pacientes com IVC, sugerindo maior capacidade de refletir limitações físicas e funcionais nessa população quando comparado ao PGI. O PGI mostrou associação apenas com medidas físicas/morfológicas, sem relação com testes funcionais.

Palavras-chave: insuficiência venosa crônica; qualidade de vida; civiq-14; pgi; funcionalidade.