

RESUMO SIMPLES - REABILITAÇÃO E DESEMPENHO FUNCIONAL

APLICABILIDADE DO GLITTRE-ADL TEST NA AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE PACIENTES COM CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA

Ana Maria Andressa Silva (anamariaandressa741@gmail.com)

Marina Silva Reis (Marina.reis@ufvjm.edu.br)

Antonielly Rocha De Souza Pereira (antonielly.rocha@ufvjm.edu.br)

Stefânia Guimarães Nery (Stefania.guimaraes@ufvjm.edu.br)

Davi Souza Oliveira (davi.oliveira@ufvjm.edu.br)

Rafael Oliveira Castro (rafael.castro@ufvjm.edu.br)

Carlos Correia Dos Santos Filho (carlos.filho@ufvjm.edu.br)

Wallaci Damasceno Barroso (wallaci.damasceno@ufvjm.edu.br)

Thamyres Costa (thamyres.costa@ufvjm.edu.br)

Guilherme Henrique Carvalho Estolano (guilherme.estolano@ufvjm.edu.br)

Fabício Pinho Madureira (fabriciomadureira@hotmail.com)

Marcus Vinícius Accetta Vianna (marcus.vianna@ufvjm.edu.br)

Marta Valquíria Da Silva (marta.silva@ufvjm.edu.br)

Cheyenne Alves Da Fonseca (cheyenne.fonseca@ufvjm.edu.br)

Sanny Cristina De Castro Faria (sannyfaria@gmail.com)

Lucas Fróis Fernandes De Oliveira (lucas.frois@ufvjm.edu.br)

Pedro Henrique Scheidt Figueiredo (pedro.figueiredo@ufvjm.edu.br)

Henrique Silveira Costa (henrique.costa@ufvjm.edu.br)

Introdução: A avaliação funcional é um componente central no cuidado de pacientes com cardiomiopatia chagásica. Embora o Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) já apresente evidências de validade nessa população, o Glittre-ADL test pode oferecer uma abordagem complementar ao mimetizar atividades de vida diária, tornando sua aplicação potencialmente mais representativa da funcionalidade cotidiana. **Objetivos:** Investigar a aplicabilidade do Glittre-ADL test em pacientes com cardiomiopatia chagásica e verificar sua associação com o ISWT. **Métodos:** Estudo transversal com 23 pacientes com cardiomiopatia chagásica, sendo 14 (60,9%) do sexo feminino. Quanto à classe funcional, 12 pacientes estavam em NYHA I e 9 em NYHA II. Os participantes realizaram o Glittre-ADL test e o ISWT. Foram analisados o tempo médio para a execução do Glittre-ADL test, sua correlação com o desempenho no ISWT e possíveis diferenças segundo sexo e classe funcional (NYHA). **Resultados:** O tempo médio para completar o Glittre-ADL test foi de 245 ± 58 segundos. Houve correlação significativa entre o tempo no Glittre-ADL test e o desempenho no ISWT ($r=-0,496$; $p=0,022$), indicando associação moderada entre os testes. Não foram observadas diferenças no desempenho do Glittre-ADL test entre os sexos ($p=0,781$) nem entre as classes funcionais NYHA ($p=0,740$). **Conclusão:** O Glittre-ADL test mostrou-se aplicável em pacientes com cardiomiopatia chagásica e apresentou associação com o ISWT, teste previamente validado nessa população. Esses achados apoiam o uso do Glittre-ADL como ferramenta complementar para avaliação funcional, especialmente por sua maior proximidade às atividades de vida diária.

Palavras-chave: palavras-chave: doença de chagas; cardiomiopatia chagásica; funcionalidade.