



## LINFOMA NA REGIÃO DE PILORO EM FELINO – RELATO DE CASO

*Pyloric Lymphoma in a Feline – Case Report*

Jordana Costa de Paiva<sup>1\*</sup>; Karolina de Nazaré Martins Bacelar<sup>1</sup>; Maria Eduarda Andrade de Carvalho<sup>1</sup>; Ynara Martins Ferreira<sup>1</sup>; Paola Magno Baia Graças<sup>1</sup>; Moisés Cordeiro de Souza<sup>1</sup>; Andreza Araujo de Sousa<sup>1</sup>; Washington Luiz Assunção Pereira<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Discente de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural da Amazônia.

<sup>2</sup>Docente, Universidade Federal Rural da Amazônia.

\*[jordanapaivamv@gmail.com](mailto:jordanapaivamv@gmail.com)

O linfoma é uma neoplasia hematopoiética comum em felinos e apresenta comportamento biológico maligno, com origem em órgãos linfóides como o baço, fígado e linfonodos, o que possui uma grande capacidade infiltrativa nesses tecidos, além de apresentar caráter metastático, podendo acometer órgãos como coração, pulmões e sistema gastrointestinal. Sob essa perspectiva, o presente trabalho objetiva relatar uma necropsia de um felino, sem raça definida, de 6 anos de idade, macho, atendido no Hospital Veterinário Mário Dias Teixeira, na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) em Belém do Pará, apresentando anorexia e êmese, com suspeita de peritonite infecciosa felina, porém sem resposta ao tratamento. Posteriormente, o animal evoluiu para óbito e foi encaminhado ao Laboratório de Patologia Animal (LABOPAT-UFRA) para realização do exame necroscópico. Na abertura do estômago em região de piloro, próximo a curvatura maior, observou-se uma nodulação fibroelástica de coloração esbranquiçada, medindo 2,5 cm X 2,5 cm, e, ao corte, apresentou extravasamento de líquido avermelhado com odor fétido. Na análise histopatológica, evidenciou-se um processo neoplásico envolvendo todos os estratos da parede estomacal. Os achados macroscópicos e histopatológicos observados nesta necropsia, associados aos sinais clínicos apresentados pelo paciente, foram compatíveis com neoplasia linfoide, conforme descrito na literatura. Apesar de essa neoplasia ser frequente na espécie felina, sua incidência pode variar de acordo com a região anatômica acometida. Em casos que envolvem jejuno e íleo, a ocorrência é relatada em cerca de 90% dos casos, enquanto o acometimento gástrico apresenta frequência menor, variando entre 7% e 40% dos relatos. Existem diferentes métodos para identificação dessas lesões, como a palpação abdominal durante o exame clínico ou a realização de exames de imagem, como a ultrassonografia abdominal, que permite avaliar alterações estruturais na parede intestinal ou gástrica. No entanto, para o diagnóstico definitivo e diferenciação de outras enfermidades ou inflamatórias do sistema gastrointestinal, torna-se imprescindível a realização de exame histopatológico. Portanto, o linfoma pode comprometer importantes órgãos do sistema imunológico e do aparelho digestório, podendo evoluir de forma progressiva e agressiva. Dessa forma, destaca-se a importância do diagnóstico precoce, visando melhorar a qualidade de vida do paciente e aumentar sua expectativa de sobrevivência.

Palavras-chave: Estômago; gato; exame necroscópico; neoplasia linfoide.

Keywords: Stomach; cat; necropsy examination; lymphoid neoplasm.