

CARACTERÍSTICAS DA DEGLUTIÇÃO EM PACIENTES COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA

ÁGUIDA VITÓRIA FREITAS MATOS¹; FLÁVIA LUYSI SILVA COIMBRA²;
THAYNNA SILVA MOURÃO¹; JUAREZ BELMIRO MORAES JUNIOR²

¹Discente do Curso de Graduação em Fonoaudiologia, Universidade Ceuma, São Luís, Maranhão.

²Docente do Curso de Graduação em Biomedicina e Odontologia, Universidade Ceuma, São Luís, Maranhão.

E-mail: flavialuisysilvacoimbra@gmail.com

RESUMO - Introdução: A encefalopatia crônica não progressiva, paralisia cerebral é uma condição neurológica não progressiva decorrente de lesão no cérebro imaturo, caracterizada por alterações do tônus, postura e movimento, podendo comprometer o controle neuromotor das funções orais. Entre as manifestações clínicas frequentes, destacam-se alterações na deglutição decorrentes da disfunção motora orofaríngea. Objetivo: Descrever as principais características da deglutição em pacientes com paralisia cerebral, considerando alterações funcionais nas diferentes fases do processo de deglutição. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura realizada nas bases de dados PUBMED, SCIELO, Medline e LILACS, com inclusão de estudos publicados em português e inglês que abordassem alterações da deglutição em indivíduos com paralisia cerebral. Foram analisados artigos originais, revisões de literatura e estudos clínicos relacionados à disfagia nessa população. Resultados: Observou-se que pacientes com paralisia cerebral frequentemente apresentam disfagia orofaríngea associada a alterações do controle motor oral, incluindo fechamento labial ineficiente, redução da coordenação entre sucção, mastigação e deglutição, atraso no transporte oral do bolo alimentar e dificuldade na coordenação entre deglutição e respiração. Essas alterações podem resultar em engasgos, aspiração traqueal, ingestão alimentar prolongada e risco aumentado de desnutrição e infecções respiratórias. Conclusão: As alterações da deglutição em indivíduos com paralisia cerebral apresentam origem neuromotor e podem comprometer significativamente a segurança alimentar e o estado nutricional, ressaltando a importância da avaliação precoce e do acompanhamento fonoaudiológico especializado.

Palavras-chave: paralisia cerebral; disfagia; deglutição.