

RESUMO - REUNIÃO DE RESISTÊNCIA A CARRAPATICIDAS

ESTUDOS PRELIMINARES DA EFICÁCIA DE ÓLEOS ESSENCIAIS SOBRE IXODÍDEOS DA ESPÉCIE AMBLYOMMA SCULPTUM

Glenda Soares Botelho (glendaaa.153@gmail.com)

Andrea Cristina Higa Nakaghi (andrea.nakaghi@prof.uniso.br)

Conhecido como carrapato-estrela ou carrapato-do-cavalo, a espécie *Amblyomma sculptum* é um dos principais vetores da *Rickettsia rickettsii*, causadora da Febre Maculosa Brasileira, representando uma ameaça à saúde pública e à indústria animal, sendo amplamente distribuídos no Brasil. A utilização indiscriminada de antiparasitários para o controle deste parasito tem levado a sinais de resistência. Portanto, cresce o interesse por métodos alternativos, como o uso de óleos essenciais. Atualmente, com base em estudos científicos, diversos compostos naturais demonstram potencial acaricida. Este presente estudo visa a avaliação da eficácia *in vitro* destes óleos essenciais em sua atividade acaricida contra carrapatos da espécie *Amblyomma sculptum*. Fêmeas ingurgitadas da espécie citada foram coletadas de equinos e submetidas ao Teste de Imersão de Adultos (TIA). Foram testados os óleos de *Oreganum vulgare* (orégano), *Cymbopogon nardus* (citronela) e extrato de *Annona muricata* (graviola), nas concentrações de 10% e 20%, realizando-se a eficácia comparada com princípios ativos já conhecidos, como

Cipermetrina e Clorpirifós. Os resultados demonstraram que os óleos de *Cymbopogon nardus* e o extrato de *Annona muricata* em ambas as concentrações não atingiram o percentual de eficácia acaricida determinada em = 95% pela FAO, obtendo-se eficácia de 74% e 0% na concentração de 10% respectivamente, e 76% e 64% na concentração de 20%. Contudo, o óleo essencial de *Origanum vulgare* apresentou eficácia acaricida de 100% em ambas concentrações, com eficácia semelhante ao antiparasitário comercial, atuando na inibição da postura e na eclosão larval. O pós-teste de Tukey demonstrou diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos orégano e graviola ($p = 0,024$), evidenciando maior eficácia acaricida do óleo essencial de orégano. Não houve diferença significativa entre citronela e orégano ($p = 0,790$), nem entre citronela e graviola ($p = 0,067$), embora nesta última tenha sido observada tendência de diferença estatística. A massa de ovos obtidas através dos testes com os óleos de citronela e graviola foram maiores, enquanto nos testes com óleo de orégano houve redução, confirmando os resultados de eficácia acaricida. Conclui-se através dos resultados obtidos, que o óleo essencial de *Origanum vulgare* desempenha excelente função acaricida contra carrapatos da espécie *Amblyomma sculptum*, quando testados in vitro, sendo necessário demais pesquisas acerca de concentrações mínimas eficazes, além de sua viabilidade in vivo.

Palavras-chave: controle de carrapatos; carrapato-estrela; *annona muricata*; *cymbopogon nardus*; *origanum vulgare*.