

RESUMO - PROTOZOOLOGIA E PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR
VETORES

**DETECÇÃO DE DNA DE NEOSPORA SP. EM EQUINOS DA REGIÃO NORTE
DO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL**

João Pedro Sasse (joao.pedro.sasse@uel.br)

Sergio Cardim (sergio.cardim@cogna.com.br)

Jordan Gregorio Lucca Cardoso (jordan_lucca@hotmail.com)

Manuela Amanda Jorge (manuela.amanda@hotmail.com)

Jayne Dallago Ribeiro (dallagojayne@gmail.com)

Fernando Pietrini Soufen (fernando.pietrini@uel.br)

Amanda Filus Marchese (amanda.filus.marchese@uel.br)

José Arthur Dos Santos Custódio (jose.arthur.santos@uel.br)

Fernando De Souza Rodrigues (fernandosr@uel.br)

João Luis Garcia (jlgarcia@uel.br)

A neosporose equina é causada pelos eucariotos *Neospora caninum* e *Neospora hughesi*, parasitas intracelulares obrigatórios pertencentes ao filo Apicomplexa. As duas espécies provocam diferentes manifestações clínicas: N.

caninum está mais associado a problemas reprodutivos, enquanto *N. hughesi* está relacionado a distúrbios neurológicos. Estudos sorológicos e moleculares apontam que os cavalos podem atuar como hospedeiros intermediários, mantendo o ciclo do protozoário e contribuindo, ainda que de forma secundária, para a epidemiologia da infecção. Além disso, embora muitos animais infectados permaneçam assintomáticos, já foram descritos casos associados a aborto, alterações neurológicas e miopatias inflamatórias. A escassez de investigações sistemáticas em equinos reforça a necessidade de monitoramento, especialmente em regiões de alta densidade de criação e em rebanhos de elevado valor econômico. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a ocorrência de *Neospora* sp. em equinos da região norte do estado do Paraná. Foram coletadas 100 amostras de sangue de equinos adultos, provenientes de diferentes propriedades rurais situadas na região norte do Paraná, Brasil. O DNA genômico foi extraído a partir do sangue total, pelo Kit Nzytech, de acordo com as recomendações do fabricante, e submetido à reação em cadeia da polimerase (PCR), utilizando primers específicos para o gene ITS-1, amplamente empregado na detecção de *Neospora* sp.. Foi detectada ocorrência de *Neospora* sp. em 2% (2/100) das amostras, valor inferior à maioria dos estudos nacionais, mas suficiente para evidenciar circulação do protozoário na região. Fatores de risco como contato com cães, manejo inadequado e transmissão vertical são destacados como determinantes na perpetuação do parasita. Embora muitos equinos infectados permaneçam assintomáticos, foram relatados casos de aborto, alterações neurológicas e miopatias inflamatórias, que podem comprometer a reprodução e o desempenho atlético. Conclui-se que, apesar da baixa prevalência, a neosporose equina merece atenção sanitária e monitoramento contínuo, especialmente em rebanhos de alto valor zootécnico.

Palavras-chave: neosporose; eucarioto; pcr; equideocultura.