

RESUMO - REUNIÃO DE RESISTÊNCIA A CARRAPATICIDAS

PERFIL HEMATOBIOQUÍMICO DE BOVINOS LEITEIROS TRATADOS COM BIOATIVO DE PURPUREOCILLIUM LILACINUM BIC 0119 NO CONTROLE DE RHIPICEPHALUS MICROPLUS

Gabriel Henrique Santos Silveira (gabrielhenriquew@gmail.com)

Amanda Tomé Rocha Resende (contact.amandatome@gmail.com)

Giovanna Rodrigues Goulart (giovannargoulart1997@gmail.com)

Isabel Cristina Padula Paz (isabel@biotainova.com.br)

Alexandre Martins Guimarães (contato@biotainova.com.br)

Daniel Sobreira Rodrigues (dsrodrigues@epamig.br)

Eustáquio Resende Bittar (eustaquio.bittar@uniube.br)

Joely Ferreira Figueiredo Bittar (joely.bittar@uniube.br)

A adoção de estratégias sustentáveis para o controle do carrapato-do-boi (*Rhipicephalus microplus*) requer comprovações de inocuidade dos bioinsumos utilizados em bovinos. Objetivou-se assim, avaliar o perfil hematológico e bioquímica (hepático, renal e proteico) de vacas leiteiras submetidas ao uso de bioativo à base de *Purpureocillium lilacinum* BIC 0119 para controle do *R. microplus*. Foram utilizadas 20 vacas Girolando, naturalmente infestadas,

distribuídas em grupo controle (GC; n=10) e grupo tratado (GT; n=10), conforme o número médio de fêmeas ingurgitadas de 4,5–8,0 mm contadas no lado esquerdo de cada animal. O GC recebeu pulverização com água, enquanto o GT recebeu suspensão de *P. lilacinum* BIC 0119 a 10^{10} conídios/mL. As coletas sanguíneas foram realizadas antes do início do tratamento (D0) e 30 dias após a primeira pulverização (D30), por punção da veia mamária, em tubos a vácuo com e sem anticoagulante. Foram avaliados eritrograma, leucograma, plaquetograma, proteína plasmática, fibrinogênio, ALT, AST, GGT, fosfatase alcalina, bilirrubina total, ureia, creatinina, proteína total, albumina e globulina. No GC, hemácias, hemoglobina e hematócrito variaram de $6,60 \pm 0,56$ para $6,45 \pm 0,89$; $10,15 \pm 0,84$ para $9,59 \pm 1,32$ g/dL; e $30,55 \pm 2,17$ para $29,45 \pm 3,42\%$, respectivamente. No GT, esses parâmetros variaram de $6,84 \pm 0,60$ para $6,43 \pm 0,52$; $10,66 \pm 0,87$ para $9,81 \pm 0,77$ g/dL; e $31,82 \pm 2,47$ para $29,95 \pm 2,23\%$, sem padrão sugestivo de anemia associada ao tratamento. Os leucócitos totais reduziram de $12.590 \pm 7.266,43$ para $11.810 \pm 8.441,49/\mu\text{L}$ no GC e de $10.270 \pm 3.325,67$ para $8.450 \pm 2.887,23/\mu\text{L}$ no GT. As plaquetas permaneceram em valores fisiológicos em ambos os grupos. No perfil bioquímico do GT, ALT, AST e GGT variaram de $31,50 \pm 8,86$ para $26,40 \pm 6,47$; $81,30 \pm 17,36$ para $74,20 \pm 12,73$; e $16,40 \pm 4,45$ para $13,80 \pm 4,76$, respectivamente, sem elevação compatível com lesão hepática. A ureia reduziu em ambos os grupos, de $39,60 \pm 9,75$ para $21,40 \pm 5,44$ mg/dL no GC e de $36,50 \pm 6,82$ para $25,20 \pm 9,84$ mg/dL no GT. A creatinina permaneceu estável no GT, variando de $1,03 \pm 0,20$ para $0,99 \pm 0,16$ mg/dL. Proteína total e globulina mantiveram-se elevadas em ambos os grupos, sugerindo alteração inespecífica ao tratamento. Conclui-se que, nas condições avaliadas, o bioativo à base de *P. lilacinum* BIC 0119 apresentou perfil hematobioquímico favorável em curto prazo, sem alterações laboratoriais compatíveis com hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, anemia, leucocitose ou trombocitopenia.

Palavras-chave: controle biológico; hemograma; bioquímica sérica; fungos entomopatogênicos; carrapato-do-boi.