

RESUMO - PROTOZOOLOGIA E PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR
VETORES

**DIVERSIDADE DE BORRELIA SPP. EM CARRAPATOS EM FASE DE VIDA
LIVRE NA REGIÃO DA GALÍCIA, NOROESTE DA ESPANHA**

Julia Dos Santos Fonseca (juliafonseca@ufrj.br)

Matheus Dias Cordeiro (mathcordeiro@hotmail.com)

Inês Abreu Ramos (inesisabelabreu@gmail.com)

José Ángel Hernández Malagón (joseangel.malagon@usc.es)

Rita Sánchez-Andrade Fernández (rita.sanchez-andrade@usc.es)

Jackson Victor De Araújo (jvictor@ufv.br)

Adolfo Paz-Silva (adolfo.paz@usc.es)

María Sol Arias Vázquez (mariasol.arias@usc.es)

Cristiana Filipa Cazapal Monteiro (cristiana.cazapal@usc.es)

Huarrisson Azevedo Santos (huarrisson@yahoo.com.br)

A detecção de *Borrelia* spp. em carrapatos é de grande relevância para saúde pública, devido ao contato crescente entre humanos, animais domésticos, silvestres e seus carrapatos. A doença de Lyme é causada por bactérias do

gênero *Borrelia*, sendo considerada uma das zoonoses transmitida por vetores mais importantes do hemisfério norte, especialmente em regiões de clima temperado. A vigilância desses patógenos nesses vetores artrópodes é essencial para o monitoramento, avaliação de risco e implementação de estratégias preventivas. Nesse contexto, o presente estudo objetivou investigar a frequência e caracterização molecular de *Borrelia* spp. em DNA total extraído de carrapatos coletados em fase de vida livre na região da Galícia, noroeste da Espanha. As coletas ocorreram em 22 concelhos das províncias da Galícia: Lugo, Ourense, A Coruña e Pontevedra. Foram testados DNA total de 166 carrapatos de áreas de pasto no período de fevereiro a outubro de 2024 utilizando a técnica de arraste de flanela e encaminhados para identificação taxonômica. Dentre as espécies coletadas, 27 pertenciam à espécie *Rhipicephalus sanguineus* s.l., dois *Rhipicephalus bursa*, 23 *Dermacentor marginatus*, 27 *Dermacentor reticulatus* e 87 *Ixodes ricinus*. O DNA total dos carrapatos foi extraído utilizando o kit comercial da Roche®. A detecção molecular de *Borrelia* spp. foi realizada através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) com alvo no gene flagelina B (*flaB*). As amostras positivas foram sequenciadas usando o método de SANGER. As sequências obtidas foram alinhadas utilizando o programa DNA Baser® v5.11.3 e submetidas a uma busca de homologia com outras sequências depositadas no GenBank utilizando a ferramenta BLASTn. Do total analisado, 10 (6,02%) apresentaram amplificação no gene *flaB* para *Borrelia* spp. Todos os carrapatos positivos pertenciam à espécie *I. ricinus*, com uma frequência de positividade de 11,5% dentro da espécie. Nenhuma outra espécie de carrapato apresentou positividade para *Borrelia* sp. utilizando PCR para o gene *flaB*. O sequenciamento do fragmento amplificado possibilitou a identificação de uma diversidade de cinco espécies de *Borrelia*. Foram identificados quatro carrapatos positivos para *Borrelia garinii*, um para *Borrelia valaisiana*, um para *Borrelia miyamotoyi*, três para *Borrelia lusitaniae* e um para *Borrelia afzelii*. Os resultados demonstram a circulação de espécies patogênicas de *Borrelia* spp. em *I. ricinus* na região, incluindo representantes do complexo *B. burgdorferi* sensu lato e *B. miyamotoyi* (grupo da Febre Recorrente). Esses achados reforçam a importância epidemiológica de *I. ricinus* como potencial vetor de agentes zoonóticos de relevância para a saúde única na região da Galícia.

Palavras-chave: dna; doença de lyme; borrelioses; pcr; zoonose.