

RESUMO - PROTOZOOLOGIA E PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR
VETORES

**EVIDÊNCIA MOLECULAR DE INFECÇÃO POR NEOSPORA CANINUM EM
AVES SILVESTRES: DESCRIÇÕES INÉDITAS**

Ana Vitória Alves Sobrinho (anasobrinho@discente.ufg.br)

Laura Henrique (laura.henrique@estudante.ufla.br)

Luana Almeida Lopes (luana.lobes2@estudante.ufla.br)

Lais Grazielle Ribeiro Tomaz (lais.tomaz1@estudante.ufla.br)

Lorrayne Honório De Paula (lorraynehonorio@discente.ufg.br)

Nathália Rodrigues Gonçalves (nathalia0998@gmail.com)

Talita Dayane Pereira E Silva (talita.vet@hotmail.com)

Marielly Amaral Costa (mariellyac@gmail.com)

Luiz Daniel De Barros (luiz.barros@ufla.br)

Weslen Fabricio Pires Teixeira (weslenteixeira@hotmail.com)

Neospora caninum é um organismo intracelular apicomplexo, responsável por distúrbios neuromusculares em cães e perdas reprodutivas em bovinos. Considerando o ciclo silvestre como uma interface do ciclo doméstico, estudos

sorológicos e moleculares têm investigado a possível participação de espécies aviárias na epidemiologia de *N. caninum*, em função das características biológicas e ecológicas apresentadas pelo grupo e que são favoráveis à dispersão do parasito na natureza. O presente estudo teve como objetivo detectar o DNA de *N. caninum* em aves silvestres do estado de Goiás, Brasil. Foram analisadas amostras de tecido encefálico de 152 aves, pertencentes a 40 espécies distribuídas em 14 ordens, que vieram a óbito após acompanhamento clínico no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA) localizado em Goiânia. Inicialmente, procedeu-se a extração do DNA genômico, utilizando o kit comercial DNeasy Blood & Tissue (Qiagen®), seguindo as recomendações do fabricante, com adaptações no protocolo. Posteriormente, realizou-se a detecção molecular por meio da reação em cadeia da polimerase (PCR) direcionada ao gene *Nc5*. Por fim, uma análise descritiva foi conduzida determinando a frequência de positividade de espécies e ordens aviárias. *N. caninum* foi detectado em 16,45% (25/152) das aves analisadas. A maior frequência foi observada na ordem Psittaciformes, correspondendo a 56% (14/25) das amostras positivas, seguida por Passeriformes com 16% (4/25), Pelecaniformes e Strigiformes com 8% (2/25) cada, além de Columbiformes, Coraciiformes e Piciformes com 4% (1/25) cada. Entre os Psittaciformes, *Psittacara leucophthalmus* apresentou a maior positividade, com 20% (5/25), seguida por *Brotogeris chiriri* com 16% (4/25). As demais espécies, como *Amazona aestiva*, *Amazona amazonica*, *Ara ararauna*, *Eupsittula aurea* e *Orthopsittaca manilatus*, apresentaram positividade de 4% (1/25) cada. Na ordem Passeriformes, identificaram-se indivíduos positivos das espécies *Pitangus sulphuratus* com 8% (2/25), *Sporophila maximiliani* e *Tyrannus melancholicus*, ambos com 4% (1/25). Para as demais ordens, a positividade foi distribuída de forma pontual, sendo detectada em *Patagioenas picazuro* (Columbiformes), *Momotus momota* (Coraciiformes), *Theristicus caudatus* e *Syrigma sibilatrix* (Pelecaniformes), *Ramphastos toco* (Piciformes), *Athene cunicularia* e *Tyto furcata* (Strigiformes), todas com 4% (1/25). A distribuição dos resultados entre diferentes ordens, com distintos hábitos alimentares e ecológicos, sugere múltiplas vias potenciais de exposição ao parasito, possivelmente associadas à ingestão de água e solo contaminados com oocistos ou presas infectadas. Os resultados obtidos no presente estudo

representam registros inéditos da detecção do DNA de *N. caninum* nas espécies analisadas, ampliando o espectro de espécies aviárias hospedeiras do parasito.

Palavras-chave: avifauna; gene nc5; hospedeiros; neosporose; pcr.