

RESUMO - ENTOMOLOGIA E ACAROLOGIA

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA REPELÊNCIA DO ÓLEO DE FRUTA CÍTRICA EXTRAÍDO, COMERCIAL E DO LIMONENO EM NINFAS DE AMBLYOMMA SCULPTUM

Gabrielly Bernardes Rodrigues Damaceno (gabriellybrd@gmail.com)

Ana Lúcia Coutinho Teixeira (lucya_coutinho@hotmail.com)

Adrielly Bernardes Rodrigues Damaceno (adriellybrdamaceno@gmail.com)

Cinthia Alves Porfiro (cinthia_porfiro@discente.ufg.br)

Dênis Jorge Carneiro (deniscarneiro@discente.ufg.br)

Mayara Macêdo Barrozo Santos (mayaramacedob@gmail.com)

Caio Marcio De Oliveira Monteiro (caiosat@gmail.com)

Stephânia Fleury Taveira (stephaniafleury@ufg.br)

Introdução: O uso de repelente por humanos e em ambientes reduzem a aproximação de ninfas de *Amblyomma sculptum*. Assim sendo considerado uma medida profilática da doença Febre Maculosa Brasileira. Entretanto, há uma crescente preocupação no uso de compostos sintéticos como repelente, com isso, surge a necessidade de explorar a atividade repelente de carrapatos de óleos derivados de plantas. Objetivo: Extrair óleo de fruta cítrica, avaliar a

repelência de ninfas de *A. sculptum* dos óleos extraído, comercial e do marcador d-limoneno. Metodologia: O óleo extraído foi obtido das cascas da fruta cítrica pela hidrot destilação por Clevenger. Óleo comercial e o d-limoneno foram adquiridos de fornecedor (Sigma®). O bioensaio de repelência horizontal foi realizado quintuplicado em placas de Petri com dois semicírculos de papel filtro. Um lado foi tratado com as substâncias (óleo comercial, extraído e d-limoneno) a 10% em etanol e outro lado manteve o papel limpo. A repelência foi determinada nos tempos 1, 15, 30 min e 1, 2, 3, 4, 24, 48 e 72 h pela posição das 6 ninfas *A. sculptum*. não alimentadas. Resultados: O percentual de repelência foi de 80,0; 80,0; 90,0 e 83,3% para o óleo de fruta cítrica extraído; 80,0; 90,0; 93,3 e 90,0% para o óleo comercial; e 70,0; 73,3; 50,0 e 46,7% para o d-limoneno, nos tempos de 15 min, 1, 4 e 24 h, respectivamente. O óleo extraído não apresentou repelência após 72 h e o d-limoneno deixou de apresentar efeito repelente a partir de 4 h. A repelência média foi de 84,1; 77,7 e 60,2% para o óleo comercial, extraído e d-limoneno, respectivamente. O marcador do óleo de fruta cítrica, d-limoneno, apresentou baixa repelência comparado aos óleos, misturas complexas de substâncias. Tal efeito, pode ser atribuído à atividade sinérgica dos componentes presentes nos óleos. Conclusão: Os óleos de fruta cítrica e o d-limoneno apresentaram atividade repelente de ninfas. Contudo, os óleos são promissores para serem utilizados como insumo no desenvolvimento de repelentes de *A. sculptum* com efeito prolongado.

Palavras-chave: bioprospecção; óleo essencial; carrapato estrela; bioensaio de repelência.