

RESUMO - ENTOMOLOGIA E ACAROLOGIA

CARRAPATOS EM FASE DE VIDA LIVRE E EM ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ZONAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, ESTADO DO AMAPÁ, AMAZÔNIA ORIENTAL

Raissa Ribeiro Dos Santos (raissaribeirosantos12@gmail.com)

Pedro Marcelo Bezerra Da Costa (pedrom2110@gmail.com)

Davi Lima Soares (edwardcrow51@gmail.com)

Rita De Kássya Santos Da Silva (ritamedvet24@gmail.com)

Felicio Moraes Ferreira (felicioferreira20@gmail.com)

Luis Fernando Queiroz Farias (luis.farias@ifap.edu.br)

Paulo Cesar Magalhães Matos (paulo.matos@ifap.edu.br)

Os carrapatos da família Ixodidae são vetores de grande relevância na saúde animal e pública devido ao seu papel na transmissão de agentes patogênicos, sendo necessário compreender sua dinâmica em diferentes contextos ambientais, especialmente em regiões com escassez de dados, como o estado do Amapá. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo descrever a diversidade de espécies de carrapatos em fase de vida livre e sobre animais domésticos no município de Porto Grande, Amapá, bem como compreender

aspectos eco-epidemiológicos relacionados à infestação. Trata-se de uma pesquisa descritiva, conduzida em cinco propriedades rurais do município por meio de coletas utilizando a técnica de arraste de flanela (em pastagens) e coleta direta sobre animais domésticos (bovinos, n=12; cães, n=15; ovinos, n=8), que não receberam carrapaticidas 30 dias precedentes, seguida de identificação morfológica em laboratório com uso de estereomicroscópio. Foram coletados 45 carrapatos, dos quais 73,3% (33/45) correspondiam a formas larvais provenientes do ambiente e 26,7% (12/45) foram coletados sobre os animais, o que evidencia elevada contaminação ambiental. Todos os carrapatos adultos coletados estavam sobre os animais e pertenciam ao gênero *Rhipicephalus*, com ocorrência de *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* em 25% (3/12) dos bovinos e *Rhipicephalus linnaei* em 13,3% (2/15) dos cães, enquanto as formas larvais do ambiente foram identificadas como *Rhipicephalus* sp.. Dentre as cinco propriedades avaliadas pelo método de arraste, apenas uma apresentou carrapatos em fase de vida livre, sendo maior a concentração em áreas de vegetação densa, com sombreamento e baixa incidência solar no solo, indicando a influência das características ambientais na manutenção dos carrapatos, como é descrito na literatura. Os resultados observados evidenciam a presença de carrapatos do gênero *Rhipicephalus* infestando bovinos e cães no município de Porto Grande, e reforçam o papel do ambiente como um dos pilares para a sobrevivência e manutenção desses ectoparasitos. Os achados destacam a importância da integração entre manejo correto no controle das infestações, contribuindo para o conhecimento da ocorrência de carrapatos na região amazônica e fomentando o desenvolvimento de estratégias de controle mais eficazes e adaptadas à realidade do município.

Palavras-chave: ectoparasitos; ixodidae; ambiente; infestação.