APRESENTAÇÃO ORAL - EIXO 2 – PESQUISA

# ATUAÇÃO DA ESTOMATERAPIA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DE FOURNIER: REVISÃO DE LITERATURA COM ENFOQUE ASSISTENCIAL

*Cesarina Excelsa Araújo Lopes Da Silva (excelsalopess@gmail.com)*

*Marília Araripe Ferreira (mariliararipef@gmail.com)*

*Maria Cláudia Carneiro Pinto (claudiacp02@gmail.com)*

*Jamilly De Aquino Mendonça (jamilly.mendonca97@gmail.com)*

*Maria Sandra Carneiro (sandracarneiro2701@gmail.com)*

*Maria Emanuela Silveira De Oliveira (manuestoma23@gmail.com)*

Introdução: A Síndrome de Fournier é uma fasciíte necrosante de rápida progressão, caracterizada por infecção polimicrobiana, que acomete a região perineal, perianal e genital. A Estomaterapia desempenha um papel fundamental no controle de infecções, otimização da cicatrização e redução de complicações. Objetivo: Avaliar a atuação do enfermeiro estomaterapeuta no tratamento da Síndrome de Fournier. Método: Trata-se de uma revisão de literatura onde, para sua operacionalização, foram utilizadas seis etapas. O levantamento foi realizado no mês de janeiro de 2026, por meio das bases de dados SCIELO e LILACS. Foram utilizados como critérios de inclusão os artigos

dos últimos cinco anos, nos idiomas inglês e português e literaturas que abordassem sobre Estomaterapia, Tratamento e Síndrome de Fournier. Sendo excluídos da pesquisa os estudos que não forneciam acesso ao texto completo e que não abordassem o tema proposto. Resultados: Foram identificados 10 artigos, destes, 05 foram excluídos por não corresponderem aos critérios de inclusão, totalizando 5 artigos analisados. Observou-se que a atuação da Estomaterapia consiste na avaliação criteriosa da lesão; no manejo do exsudato; na utilização de produtos com ação antimicrobiana; na utilização de barreiras protetoras; na implementação de estratégias do isolamento da ferida como o manejo de estomias de derivação para proteção da ferida perineal, no uso dos adjuvantes como Laserterapia e Terapia por Pressão Negativa (TPN). Conclusão: Assim, a análise dos artigos científicos destacou o papel crucial do enfermeiro estomaterapeuta na assistência à Síndrome de Fournier, que vai desde o cuidado direto com a lesão até o suporte emocional e educacional ao paciente e familiares. As Implicações para a prática: O tratamento da Síndrome de Fournier é um desafio para a prática de enfermagem, estudos de revisão são necessários para orientar a decisão clínica de especialistas com segurança. Portanto, é essencial a realização de revisões de literatura que sumarizem as melhores práticas e orientem o tratamento fundamentado nas melhores evidências.

Palavras-chave: estomaterapia; gangrena de fournier; assistência de enfermagem.