

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E MANIFESTAÇÕES OROFACIAIS DE DISCRASIAS SANGUÍNEAS

Marielly da Silva Duarte¹ (mariellyd68@gmail.com)

Tainan Rodrigues Melo¹ (tainanrodriguesmelo@gmail.com)

Mary Angela Ribeiro¹ (mary.angela.mar@gmail.com)

Daniela Nunes Reis² (Daniela.reis@uninta.edu.br)

INTRODUÇÃO: A disfunção temporomandibular (DTM) envolve alterações articulares e/ou musculares, sendo causa frequente de dor orofacial. Contudo, doenças sistêmicas podem simular seus sinais, dificultando o diagnóstico inicial. Entre elas, destacam-se as discrasias sanguíneas, caracterizadas por alterações quantitativas ou funcionais dos componentes do sangue, capazes de gerar sangramentos, dor óssea, fadiga muscular e manifestações orais inespecíficas. Tais achados podem mimetizar DTM e retardar o reconhecimento de condições sistêmicas. **OBJETIVO:** Analisar manifestações orofaciais de discrasias sanguíneas que podem simular DTM e identificar quais tipos de DTM (muscular, articular ou mista) são mais frequentemente relacionados. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Foi realizada uma busca nas bases de dados PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo utilizando os descritores: “Hematologic Diseases”, “Temporomandibular joint dysfunction syndrome”, “Oral manifestations”, “Diagnosis differential” e “Oral cavity”, combinados por AND e OR. Foram incluídos artigos de revisão sistemática, relato de caso e revisão de literatura, publicados nos últimos 5 anos nos idiomas inglês e português com texto completo disponível. Estudos duplicados e fora da proposta foram excluídos. A busca resultou em 21 artigos dos quais 6 foram selecionados para análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A púrpura trombocitopênica imune apresentou lesões hemorrágicas e dor difusa, simulando principalmente DTM muscular. O mieloma múltiplo mostrou lesões osteolíticas e dor mandibular compatíveis com DTM articular. A IgG4-related disease envolveu ossos e tecidos moles, sendo semelhante a DTM mista. As leucemias demonstraram infiltração gengival, mucosite e dor, relacionadas à DTM muscular. Os linfomas comprometeram tecidos moles e estruturas ósseas, também se assemelhando a DTM mista. **CONCLUSÃO:** Discrasias sanguíneas podem reproduzir sinais semelhantes aos da DTM, dificultando o diagnóstico inicial. Reconhecer essas manifestações é fundamental para um diagnóstico diferencial preciso e encaminhamento adequado.

DESCRIPTORES: Hematologic diseases, Temporomandibular joint dysfunction syndrome, Oral manifestations, Diagnosis differential, Oral cavity.

¹ Acadêmico(a) de Odontologia do Centro Universitário INTA - UNINTA. Sobral, Ceará.

² Professor(a) do curso de Odontologia do Centro Universitário INTA - UNINTA. Sobral, Ceará.