PÔSTER - EIXO 3 – EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS

LASER IRRADIATION OF BLOOD E AROMATERAPIA NO MANEJO DA DOR EM EPIDERMÓLISE BOLHOSA

Madna Avelino Silva (madna.a.silva@gmail.com)

Ana Rosa Braga De Souza (anarosaenfer@gmail.com)

Joana Da Silva Assunção (jujuana.assuncao@gmail.com)

Mara Milvia Pontes Melo Resende (maramelclara@gmail.com)

Edina Maria Camelo Chaves (edna.chaves@euce.br)

Dra. Lidiane Do Nascimento Rodrigues (lidianerodrigues09@gmail.com)

INTRODUÇÃO A Epidermólise Bolhosa (EB) é uma doença genética rara caracterizada pela fragilidade cutânea e formação de bolhas após mínimos traumas, frequentemente associada à dor intensa e crônica.(HAS C, BODEMER C, et al, 2020). A terapia Intravascular Laser Irradiation of Blood (ILIB) é uma terapia que também promove efeitos de analgesia, sedação e dor (SILVA VG et al,2022).O interesse pelo estudo surgiu a partir do cuidado em uma criança EB em tratamento e o presente estudo justifica-se com o intuito de contribuir com o tratamento de EB no controle não farmacológico da dor.OBJETIVO:Descrever a experiência do enfermeiro estomaterapeuta na aplicação laser irradiação de

blood e aromaterapia no manejo da dor em EB.MÉTODO:Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado no hospital referência pediátrico. A coleta dos dados ocorreu no mês junho de 2024 o levantamento dos dados foi utilizado um formulário padronizado pelo serviço.O estudo é o desdobramento de um projeto guarda-chuva intitulado “Assistência em Estomaterapia em Hospital Pediátrico”ressalta-se que a coleta de dados desse estudo já possui autorização do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) e aprovado com o CAAE: 57349522.1.0000.5042 e número do parecer: 5.547.644 obedecendo aos preceitos éticos.Os critérios de inclusão foi não apresentar alterações bioquímicas lesão superficial inflamatória sem sinais de infecção o critério exclusão foram lesões com células cancerígenas Análise foi em dois momentos: o primeiro foi esclarecimento da terapia, a assinatura (TCLE) , análise bioquímica no prontuário; no segundo momento foi utilizando-se o LBI na radial esquerda.RESULTADOS:Observou-se redução significativa da dor, melhora do aspecto das lesões e impacto positivo no bem-estar da criança e de seus familiares.CONCLUSÃO Conclui-se que a associação dessas terapias pode representar uma estratégia promissora no manejo não farmacológico da dor em pacientes com EB, sendo necessária a realização de estudos adicionais para consolidação de protocolos clínicos..IMPLICAÇÕES PARA PRÁTICA EM SAÚDE/ENFERMAGEM:Espera-se que este estudo amplie a compreensão dos profissionais de saúde acerca da importância da atuação do enfermeiro especialista no manejo da dor, incentivando a qualificação contínua e a sistematização da assistência.

Palavras-chave: palavras chaves: terapia a laser; dor; epidermólise bolhosa.