

REABILITAÇÃO ESTÉTICA MINIMAMENTE INVASIVA ASSOCIANDO PLÁSTICA GENGIVAL, CLAREAMENTO DENTAL E REANATOMIZAÇÃO COM RESINA COMPOSTA: RELATO DE CASO

Emanuella Pereira Gonçalves ¹(manu.odont@gmail.com)

Raimundo Jefferson Elias Pimenta¹(jeffersoneliaspimenta0@gmail.com)

Expedito Sérgio Barroso de Carvalho ¹(expesergio987@gmail.com)

Diego Ramos Aguiar² (diegoramosaguiar@hotmail.com)

Introdução: A estética dentária influencia diretamente a autoestima, as relações sociais e a qualidade de vida, constituindo um importante foco da Odontologia contemporânea. A harmonia do sorriso resulta da integração entre forma, proporção, simetria e alinhamento dentário, fatores essenciais para resultados estéticos naturais. Nesse contexto, a proporção áurea destaca-se como parâmetro relevante no planejamento estético, contribuindo para um sorriso equilibrado. A reanatomização dental com resina composta apresenta-se como uma alternativa conservadora e minimamente invasiva, promovendo o restabelecimento da anatomia, da função e da estética.**Objetivo:** O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de reabilitação estética do sorriso por meio da associação entre cirurgia plástica gengival, clareamento dental e reanatomização de incisivos laterais superiores com resina composta.**Relato de Caso:** Paciente do sexo feminino, jovem, compareceu à clínica odontológica apresentando como queixa principal sorriso gengival, insatisfação com a coloração dentária e desarmonia anatômica dos incisivos laterais superiores. Após exame clínico e planejamento estético, realizou-se inicialmente cirurgia plástica gengival para correção do contorno periodontal e redução da exposição gengival. Após período de cicatrização, foi instituído protocolo de clareamento dental combinado, envolvendo clareamento em consultório associado ao clareamento caseiro supervisionado. Concluída a etapa clareadora, realizou-se moldagem para obtenção de modelo de gesso e posterior enceramento diagnóstico dos dentes 12 e 22. A partir do enceramento, confeccionou-se guia em silicone para auxílio na execução restauradora. A reanatomização dos incisivos laterais superiores foi realizada por meio da técnica direta em resina composta, utilizando incrementos de dentina e esmalte translúcido, visando restabelecimento estético e proporcional dos elementos dentários.**Considerações Finais:** Ao término do tratamento, observou-se melhora estética do sorriso, com maior integração entre contorno gengival, proporção dentária e características cromáticas. A associação entre cirurgia periodontal estética, clareamento dental e reanatomização com resina composta mostrou-se uma alternativa conservadora, previsível e eficaz para reabilitação estética em pacientes jovens.

Descritores:Esthetics Dental ;Composite Resins ;Smile

¹ Acadêmico(a) de Odontologia do Centro Universitário INTA – UNINTA. Sobral, Ceará.

² Professor(a) do curso de Odontologia do Centro Universitário INTA – UNINTA. Sobral, Ceará.