

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PLANEJAMENTO E PREVISIBILIDADE CIRÚRGICA DE TERCEIRO MOLAR INFERIOR MESIOANGULADO

Isaías David Araújo Lopes ¹ (Isaiasdavi2021.2@gmail.com)
Paulo Victor Carneiro Araújo ¹ (victorraj@gmail.com)
Marvyn Vasconcelos Justo ¹ (marvynjusto27@gmail.com)
João Gabriel de Araújo ¹ (Gabrielzorraz.ga.124@gmail.com)
Juan Diego Costa Carvalho ² (juandcc2015@gmail.com)

Introdução: A cirurgia de terceiro molar, popularmente conhecida como extração do siso, é um procedimento odontológico indicado para remover dentes que podem causar dor, infecções, desalinhamento dentário ou dificuldades de higienização. Esses dentes geralmente erupcionam entre os 17 e 25 anos e sua remoção visa prevenir complicações futuras, promovendo melhor saúde bucal.

Objetivo: Descrever o manejo cirúrgico para a remoção de um terceiro molar inferior semincluso, impactado em posição mesioangulada e horizontal, evidenciando a importância do diagnóstico por imagem no planejamento e sucesso do procedimento. **Relato de caso:** Paciente M.M.N.M, sexo feminino, 22 anos, normossistêmica, procurou atendimento odontológico relatando episódios recorrentes de dor e desconforto na região posterior da mandíbula. A avaliação clínica e radiográfica revelou os elementos 38 e 48 impactados em posição horizontal, ambos em íntima relação com o canal mandibular. Devido à proximidade com o nervo alveolar inferior, foi solicitada tomografia computadorizada para melhor planejamento cirúrgico. A paciente apresentava episódios frequentes de pericoronarite associados ao elemento 48 e dor na região do elemento 38 durante a mastigação. Diante dos achados clínicos e imaginológicos, indicou-se a exodontia do elemento 38. Como protocolo pré-operatório, foi administrada dexametasona. O procedimento foi realizado sob anestesia local, sendo necessária ostectomia e odontosecção em virtude da posição horizontal e do grau de inclusão óssea do dente. A cirurgia ocorreu sem intercorrências. No pós-operatório, foram prescritos amoxicilina, dexametasona e dipirona. Após sete dias, observou-se adequada cicatrização, ausência de complicações e regressão completa do edema. **Considerações Finais:** A exodontia de terceiro molar inferior impactado em posição horizontal, mesmo quando associada à proximidade do canal mandibular, pode ser realizada com segurança mediante adequado planejamento clínico e imaginológico, associado à execução de técnicas cirúrgicas como ostectomia e odontosecção, como também a correta prescrição medicamentosa, proporciona recuperação satisfatória e baixo índice de complicações pós-operatórias.

Descritores: Descritores: Terceiro Molar; Dente Impactado; Exodontia; Cirurgia Bucal; Tomografia Computadorizada

¹Acadêmico(a) de Odontologia do Centro Universitário INTA – UNINTA. Sobral, Ceará.

²Professor(a) do curso de Odontologia do Centro Universitário INTA – UNINTA. Sobral, Ceará.