RESUMO - IV. PESQUISA CIENTÍFICA RELACIONADA À AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS E GESTÃO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM

BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM DRENOS CIRÚRGICOS NO PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO: REVISÃO DE ESCOPO BEST NURSING PRACTICES FOR PATIENTS WITH SURGICAL DRAINS IN THE POSTOPERATIVE PERIOD: A SCOPING REVIEW MEJORES PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA PARA PACIENTES CON DRENAJES QUIRÚRGICOS EN EL PE

Tainá Ferreira Santos Vilhegas (vilhegastaina@gmail.com)

Caio De Araujo Cassiano (caiocassiano81@gmail.com)

Pedro Brandão De Almeida (enfermagempedrobrandao@gmail.com)

Lilian Burguez Romero (lilianburguez@hotmail.com)

Rosilene Ferreira (rosilene.alvesferreira.uerj@gmail.com)

Tallita Mello (tallitamell@gmail.com)

Introdução: Os drenos cirúrgicos são amplamente utilizados na prática clínica para permitir a remoção de fluidos e secreções das cavidades corporais. Objetivo: mapear na literatura nacional e internacional as principais boas práticas de enfermagem na assistência ao paciente cirúrgico com drenos

cirúrgicos nas unidades cirúrgicas. Método: Revisão de escopo conduzida segundo as diretrizes do Instituto Joanna Briggs e estruturada conforme o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). A estratégia de busca e os critérios de elegibilidade foram definidos pelo acrônimo PCC: População (pacientes cirúrgicos com drenos cirúrgicos), Conceito (boas práticas de enfermagem) e Contexto (unidades de internação cirúrgicas, enfermarias, centro cirúrgico e ambulatórios). A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: LILACS, MEDLINE, CINAHL, Embase, Web of Science, Cochrane e Scopus. Para a literatura cinzenta, consultaram-se: BDTD, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, AORN, CDC, manuais da ANVISA, NIC e WorldCat. Considerou-se estudos em qualquer idioma e sem limitação temporal. Os estudos resultantes da busca foram exportados para a plataforma Rayyan®, para remoção das duplicatas e análise por dois revisores independentes, que realizaram a seleção (títulos e resumos) e posteriormente a extração de dados em planilha Microsoft Excel®, após teste piloto com concordância mínima de 75%. Por fim, a análise qualitativa de conteúdo gerou uma síntese narrativa, acompanhada por fluxograma, quadros e diagramas. Resultados: Selecionaram-se 35 estudos que abordaram boas práticas de enfermagem com dispositivos de drenagem, incluindo o monitoramento, observação de sinais de infecção e integridade, troca de curativo em técnica asséptica, avaliação para remoção além de cuidados específicos com cada tipo de dreno. Conclusão: O cuidado baseado nas melhores evidências científicas disponíveis na literatura é fundamental para garantir a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada.

Introduction: Surgical drains are widely used in clinical practice to allow the removal of fluids and secretions from body cavities. Objective: To map the main best nursing practices in the care of surgical patients with surgical drains in surgical units, both nationally and internationally. Method: A scoping review was conducted according to the Joanna Briggs Institute guidelines and structured according to the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). The search strategy and eligibility criteria were defined by the acronym PCC: Population (surgical patients

with surgical drains), Concept (best nursing practices), and Context (surgical inpatient units, wards, surgical center, and outpatient clinics). The search was conducted in the following databases: LILACS, MEDLINE, CINAHL, Embase, Web of Science, Cochrane, and Scopus. For grey literature, the following were consulted: BDTD, CAPES Thesis and Dissertation Catalog, AORN, CDC, ANVISA manuals, NIC, and WorldCat. Studies in any language and without time limitations were considered. The studies resulting from the search were exported to the Rayyan® platform for duplicate removal and analysis by two independent reviewers, who performed the selection (titles and abstracts) and subsequently extracted data into a Microsoft Excel® spreadsheet, after a pilot test with a minimum agreement of 75%. Finally, the qualitative content analysis generated a narrative synthesis, accompanied by a flowchart, tables, and diagrams. Results: 35 studies were selected that addressed good nursing practices with drainage devices, including monitoring, observation of signs of infection and integrity, dressing change using aseptic technique, evaluation for removal, and specific care for each type of drain. Conclusion: Care based on the best scientific evidence available in the literature is fundamental to ensuring patient safety and the quality of care provided.

Introducción: Los drenajes quirúrgicos se utilizan ampliamente en la práctica clínica para permitir la eliminación de líquidos y secreciones de las cavidades corporales. Objetivo: Mapear las principales mejores prácticas de enfermería en el cuidado de pacientes quirúrgicos con drenajes quirúrgicos en unidades quirúrgicas, tanto a nivel nacional como internacional. Método: Se realizó una revisión exploratoria de acuerdo con las directrices del Instituto Joanna Briggs y estructurada según los Elementos de Informe Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis para Revisiones Exploratorias (PRISMA-ScR). La estrategia de búsqueda y los criterios de elegibilidad se definieron mediante el acrónimo PCC: Población (pacientes quirúrgicos con drenajes quirúrgicos), Concepto (mejores prácticas de enfermería) y Contexto (unidades de hospitalización quirúrgica, salas, centro quirúrgico y clínicas ambulatorias). La

búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos: LILACS, MEDLINE, CINAHL, Embase, Web of Science, Cochrane y Scopus. Para la literatura gris, se consultaron las siguientes bases de datos: BDTD, Catálogo de Tesis y Disertaciones de CAPES, AORN, CDC, manuales de ANVISA, NIC y WorldCat. Se consideraron estudios en cualquier idioma y sin limitaciones de tiempo. Los estudios resultantes de la búsqueda se exportaron a la plataforma Rayyan® para eliminar duplicados y analizarlos por dos revisores independientes, quienes realizaron la selección (títulos y resúmenes) y posteriormente extrajeron los datos a una hoja de cálculo de Microsoft Excel®, después de una prueba piloto con un acuerdo mínimo del 75%. Finalmente, el análisis cualitativo del contenido generó una síntesis narrativa, acompañada de un diagrama de flujo, tablas y diagramas. Resultados: Se seleccionaron 35 estudios que abordaban las buenas prácticas de enfermería con dispositivos de drenaje, incluyendo monitorización, observación de signos de infección e integridad, cambio de apósitos con técnica aséptica, evaluación para la extracción y cuidados específicos para cada tipo de drenaje. Conclusión: La atención basada en la mejor evidencia científica disponible en la literatura es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y la calidad de la atención brindada.

Palavras-chave: guia de prática clínica; cuidados de enfermagem; drenagem; período pós-operatório; revisão de escopo clinical practice guideline; nursing care; drainage; postoperative period; scope review guía de práctica clínica; cuidados de enfermería; drenaje; periodo postoperatorio; revisión del alcance.