RESUMO - V. PESQUISA CIENTÍFICA RELACIONADA À FORÇA DE TRABALHO EM ENFERMAGEM E OS SISTEMAS DE SAÚDE

TENDENCIA DEL INTENTO DE SUICIDIO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN COLOMBIA.

Ladini Sunanda Hernández Bello (lhernandezb2@unicartagena.edu.co)

Zuleima Cogollo Milanés (zcogollom@unicartagena.edu.co)

Daniela Ramirez Ruiz (dramirzr@unicartagena.edu.co)

Tendências de tentativas de suicídio antes, durante e depois da pandemia de Covid-19 na Colômbia.

Resumo:

Introdução: O comportamento suicida é considerado um importante problema de saúde pública em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou aproximadamente 700.000 suicídios em 2019, com uma incidência global de 1 por 10.000 pessoas, sendo a faixa etária de 15 a 29 anos a mais afetada. A frequência de tentativas de suicídio é influenciada por períodos de grave estresse social, como recessões econômicas, guerras e grandes catástrofes sociais, como pandemias. Objetivo: Estimar a frequência de tentativas de suicídio entre adolescentes e jovens adultos na Colômbia antes, durante e após a pandemia de COVID-19 de 2020.

Método: Foi realizado um estudo ecológico exploratório na população colombiana de 11 a 30 anos, utilizando dados sobre tentativas de suicídio relatadas ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Pública entre 2016 e

2022. As variáveis coletadas foram: sexo, idade, departamento, mecanismo e fatores desencadeantes e predisponentes. A análise dos dados foi realizada utilizando o Epi Info versão 7.2. As taxas de incidência de tentativas de suicídio foram calculadas por sexo, idade e departamento e comparadas entre os períodos do estudo.

Resultados: Em comparação com o período pré-pandemia, a taxa geral de tentativas de suicídio aumentou significativamente mais (70%) durante o período pós-pandemia do que durante a pandemia (2%). Indivíduos de 16 a 20 anos apresentaram a maior taxa de tentativas de suicídio em todos os períodos: 16,6 por 104 no período pré-pandemia, 17,8 por 104 durante a pandemia e 24,6 por 104 no período pós-pandemia; essa taxa foi maior em mulheres do que em homens. Variações significativas nas tendências foram observadas entre os departamentos, com alguns apresentando uma diminuição nas taxas de tentativas de suicídio durante a pandemia, enquanto outros apresentaram um aumento.

Conclusão: Na Colômbia, diferentemente de outros países, a taxa nacional de tentativas de suicídio permaneceu relativamente estável durante a pandemia, mas aumentou significativamente no período pós-pandemia, com diferenças por sexo, idade e região.

Palavras-chave: suicídio; tentativa de suicídio; COVID-19; pandemias. Fonte: DeCS.

Suicide attempt trends before, during and after the Covid-19 pandemic in Colombia

ABSTRACT:

Introduction: Suicidal behavior is considered a major public health problem worldwide. World Health Organization (WHO) reported approximately 700,000 suicides in 2019, for a global incidence of 1 per 10,000 people, with people aged 15-29 being the most affected population. Frequency of suicide attempts is impacted by periods of serious social tension, such as economic recessions, wars, and major social catastrophes like pandemias.

Objective: Estimate the frequency of suicide attempts in adolescents and young people in Colombia before, during and after the 2020 Covid-19 pandemic.

Method: exploratory ecological study on the Colombian population between 11 and 30 years old using suicide attempt data. suicide reported to the national Public Health Surveillance System between 2016 and 2022. The variables collected were: sex, age, department, mechanism, triggering and predisposing factors. Data analysis was done with Epi Info version 7.2. Incidence rates of suicide attempts were calculated by sex, age and department and compared across the periods of study.

Results: Compared to the pre-pandemic period, the overall suicide attempt rate increased much more (70%) during the post-pandemic period than during the pandemic (2%). People within the age range 16 to 20 years old had the highest rate of suicide attempts across all periods - 16.6 x 104 in the pre-pandemic, 17.8 in the pandemic and 24.6 in the post-pandemic - and it was higher in women than in men. There were important variations in trends at the territorial level as some departments decreased their rates of suicide attempts during the pandemic while others increased them.

Conclusion: In Colombia, contrary to other countries, the national rate of suicide attempts remained relatively stable during the pandemic, but increased significantly in the post pandemic with differences by sex, age and between regions.

Keywords: suicide; suicide attempt; COVID-19; pandemics. Source DeCs.

Tendencia del intento de suicidio antes, durante y después de la pandemia de Covid-19 en Colombia.

Resumen:

Introducción: El comportamiento suicida se considera un importante problema de salud pública a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó aproximadamente 700.000 suicidios en 2019, con una incidencia global de 1 por cada 10.000 personas, siendo la población de 15 a 29 años la más afectada. La frecuencia de los intentos de suicidio se ve influenciada por

periodos de grave tensión social, como recesiones económicas, guerras y grandes catástrofes sociales como pandemias.

Objetivo: Estimar la frecuencia de intentos de suicidio en adolescentes y jóvenes en Colombia antes, durante y después de la pandemia de COVID-19 de 2020.

Método: Estudio ecológico exploratorio en la población colombiana de entre 11 y 30 años utilizando datos de intentos de suicidio reportados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Pública entre 2016 y 2022. Las variables recopiladas fueron: sexo, edad, departamento, mecanismo, factores desencadenantes y predisponentes. El análisis de datos se realizó con Epi Info versión 7.2. Se calcularon las tasas de incidencia de intentos de suicidio por sexo, edad y departamento, y se compararon entre los periodos de estudio.

Resultados: En comparación con el periodo prepandémico, la tasa general de intentos de suicidio aumentó mucho más (70%) durante el periodo pospandémico que durante la pandemia (2%). Las personas de entre 16 y 20 años presentaron la tasa más alta de intentos de suicidio en todos los periodos: 16,6 x 104 en el periodo prepandémico, 17,8 durante la pandemia y 24,6 en el pospandémico; esta tasa fue mayor en mujeres que en hombres. Se observaron variaciones importantes en las tendencias a nivel territorial, ya que algunos departamentos disminuyeron sus tasas de intentos de suicidio durante la pandemia, mientras que otros las incrementaron.

Conclusión: En Colombia, a diferencia de otros países, la tasa nacional de intentos de suicidio se mantuvo relativamente estable durante la pandemia, pero aumentó significativamente en el periodo pospandémico, con diferencias por sexo, edad y entre regiones.

Palabras clave: suicidio; intento de suicidio; COVID-19; pandemias. Fuente: DeCs.

Palavras-chave: suicidio; intento de suicidio; covid-19; pandemias.