

RESUMO EXPANDIDO - RELATO DE CASOS

UROLITÍASE EM JUMENTO APRESENTANDO PROLAPSO RETAL COMO PRINCIPAL SINAL CLÍNICO

Márcio De Freitas Espinoza (marcio.freitas@baraodemaua.br)

Julia De Jesus Mogno (jjmogno@hotmail.com)

Gustavo Garkalns De Souza Oliveira (gustavogs@baraodemaua.br)

Antônio Fernando Bariani Junior (antonio.bariani@baraodemaua.br)

Daniela Junqueira De Queiroz (danielajqueiroz@hotmail.com)

Urolitíase é a formação de sedimentos em qualquer região do trato urinário. Trata-se de uma patologia de baixa prevalência em equídeos, porém que ocorre e acomete animais independentemente de raça ou idade, castrados ou não, podendo causar danos graves, até mesmo levando o animal a óbito ou à necessidade de eutanásia frente à impossibilidade de remoção do cálculo. O presente trabalho tem como objetivo relatar uma obstrução uretral parcial causada por cálculo em um jumento da raça Pêga que apresentou prolapso retal como principal sinal clínico. Foi realizada amputação de reto diante da gravidade do quadro clínico e uretrotomia perineal para se tentar remoção do cálculo, após diagnóstico por uretroscopia. Diante da impossibilidade de remoção do cálculo o animal foi eutanasiado.