

Influência da pandemia da Covid-19 na notificação de lesões cutâneas por hanseníase no Brasil

Fernanda Hanada Baltazar Harada^a, Christian Gonçalves Sassaki^a, Karen Cristiane Pereira de Moraes^b.

^a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)

^b Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Introdução: a hanseníase é uma doença causada pelo *Mycobacterium leprae*, que pode afetar qualquer indivíduo, suas consequências acometem fortemente o doente, principalmente sua sensibilidade térmica, dolorosa, tátil e muscular. Dessa forma, entende-se que analisar como a pandemia da Covid-19 influenciou a notificação de lesões cutâneas por hanseníase no Brasil entre 2019 e 2020 é importante, uma vez que nesse período é possível comparar os dados pré-pandemia e durante a pandemia da Covid-19. Assim, o objetivo do trabalho é analisar a influência da pandemia da Covid-19 na notificação de lesões cutâneas por hanseníase no Brasil. **Metodologia:** estudo retrospectivo, transversal, descritivo e epidemiológico. Para coleta de dados foi utilizado o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), via TABNET, no período de abril de 2023. As variáveis coletadas foram: lesões cutâneas segundo ano diagnosticado, por hanseníase, no período de 2019 a 2020. **Resultados:** no período em questão foram notificadas 393.301 lesões cutâneas. Em 2019 notificou-se 237.527 lesões e em 2020 155.774 lesões. **Conclusão e Implicações:** a análise da influência da pandemia da Covid-19 na notificação de lesões cutâneas por hanseníase no Brasil se mostrou importante, pois houve uma queda entre o ano anterior à pandemia (2019) e o primeiro ano de pandemia (2020), demonstrando que esse evento impossibilitou a notificação da doença, por conta do isolamento social e do medo da população em se expor a Covid-19.

Descritores: Hanseníase, *Mycobacterium leprae*, Brasil, COVID-19

Apoio financeiro: financiamento próprio