

RESUMO SIMPLES - RELATO DE CASOS

EVISCERAÇÃO DE OMENTO SEGUIDA DE EVISCERAÇÃO DE JEJUNO EM EQUINO SUBMETIDO A ORQUIECTOMIA ELETIVA

Lidiany Cristina Fonseca Carvalho (vetlidianyfonseca@gmail.com)

Camilla Larissa De Souza Maia (camillamaia@vetufmg.edu.br)

João Egidio (joao-egidio@hotmail.com)

Matheus Camilo Vicente Santos (matheusmcvs@outlook.com)

Pedro Machado De Fatima (Pedro.machado022@gmail.com)

Diego Duarte Varela (diegoduarte varela@gmail.com)

Lucas Antunes Dias (lucasantunesvetufmg@gmail.com)

Andressa Batista Da Silveira Xavier (asilveiravet@gmail.com)

A evisceração é uma das principais consequências em castrações de equinos com consequências graves podendo levar ao óbito do animal. Um equino, macho, com 4 anos de idade, Mangalarga Marchador, pesando 450 Kg, foi atendido no hospital veterinário da UFMG, após o animal ser submetido à orquiectomia na propriedade, havendo a evisceração do omento pelo anel inguinal logo após o procedimento. O animal foi palpado via transretal e identificado abertura de aproximadamente 5 cm do anel inguinal esquerdo por onde se pronunciava o omento. Foi realizado a emasculação do omento e amputação da parte exteriorizada, seguido da colocação de compressas cirúrgicas e sutura da incisão escrotal . Foram administrados Gentamicina (6,6mg/kg SID IV), Flunixin Meglumine (1,1 mg/kg - SID IV), Penicilina (30.000

UI - SID IM). Com dois dias após a internação o animal desencadeou um episódio de cólica aguda, apresentando FC= 90bpm, FR= 24mpm sudorese intensa, mucosas pálidas, hipermotilidade, além de aumento de volume do escroto. A evisceração foi confirmada pelo exame ultrassonográfico da região escrotal e por meio de palpação transretal. Devido o desinteresse na realização da celiotomia por parte do proprietário o animal foi submetido a eutanásia. Durante a necrópsia foi evidenciado cerca de 3m da porção oral do jejuno encarcerados e sobre forte tensão na raiz do mesentério, justificando o quadro de dor aguda e severa.