

RELAÇÃO DAS VARIÁVEIS PESO, IDADE, QUANTIDADE DE GESTAÇÕES ANTERIORES COM O ACOMETIMENTO CONCOMITANTE DE DIABETES GESTACIONAL E PRÉ-ECLÂMPsia

Gabriela Pedroso Domingues¹, Giovana Pedroso Domingues¹, Heloísa Zagabria Ferrari¹, Fernanda Nishimura¹, Tamara Veiga Faria¹, Thiago Buzon Borrasca¹, Daniel Jarreta Coelho¹, Mariana Mendes da Silva¹, Daniel Laguna Neto¹.

¹FACERES – Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil.

INTRODUÇÃO: o número de mulheres com complicações na gravidez tem aumentado globalmente e tem porcentagem variante dependendo de fatores de risco pré-existentes, sendo as mais prevalentes a pré-eclâmpsia (PE) e Diabetes Gestacional (DG). Esses distúrbios gestacionais apresentam como fatores de risco em comum o IMC inadequado e ganho de peso excessivo durante a gestação. A PE e a DG são doenças distintas, porém, possuem a disfunção endotelial como link em comum. **OBJETIVO GERAL:** Avaliar a relação de Pré-Eclâmpsia (PE) e Diabetes Gestacional em gestantes. **MÉTODOS:** Antes de qualquer ação, o projeto será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) por meio da plataforma zoom, com base na Lei 8080/90 e na resolução CNS nº 510/16. Sendo garantido o direito de saúde para todos, principalmente às gestantes com riscos, além da confidencialidade da participante de estudo. Trata-se de um estudo aplicado e experimental com base na análise de prontuários. Os prontuários que estiverem de acordo com os critérios de elegibilidade serão selecionados com base nas suas variáveis. **RESULTADOS ESPERADOS:** Esperamos que a pesquisa traga informações para os acadêmicos de medicina, assim como também traga maiores informações aos especialistas sobre a associação de dois eventos graves da gestação. Esse projeto visa prevenção das patologias para amenizar o risco de vida da mãe e do bebê, além da melhoria da qualidade da informação recebida pelas mulheres durante o pré-natal.

PALAVRAS-CHAVE: Pré-Eclâmpsia; Diabetes Gestacional; fatores de risco.

REFERÊNCIAS:

1. Oliveira ACd, Almeida LB, Lucca A, Nascimento V. Estudo da relação entre ganho de peso excessivo e desenvolvimento de diabetes mellitus e doença hipertensiva específica na gestação. J Health Sci Inst. 2016;9.

2. Ferreira ETM, Moura NdS, Gomes MLdS, Silva EGd, Guerreiro MdGdS, Oriá MOB. Características maternas e fatores de risco para pré-eclâmpsia em gestantes. Rev Rene. 2019;7.
3. Assis TR, Viana FP, Rassi S. Estudo dos principais fatores de risco maternos nas síndromes hipertensivas da gestação. Sociedade Brasileira de Cardiologia. 2008;91:7.
4. Shikanai S, Paula JCdR, Cabral ACV, Brandão AHF. Disfunção endotelial como um link fisiopatológico entre pré-eclâmpsia e diabetes mellitus gestacional. FEMINA. 2015;43:4.
5. Brandão AHF, Guimarães LM, Lopes APBM, Leite HV, Cabral ACV. Acompanhamento longitudinal da função endotelial em gestações de mulheres saudáveis analisada pela dilatação fluxo-mediada da artéria braquial. Revista Médica de Minas Gerais (RMMG). 2012:5.
6. Sandsæter HL, Horn J, Rich-Edwards JW, Haugdahl HS. Preeclampsia, gestational diabetes and later risk of cardiovascular disease: Women's experiences and motivation for lifestyle changes explored in focus group interviews. BMC Pregnancy and Childbirth. 2019:10.