

PÔSTER ELETRÔNICO - ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E NEONATAL  
FAZENDO A DIFERENÇA NO CENÁRIO NACIONAL

**DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM IDENTIFICADOS  
NO PROCESSO DE ALEITAR MEDIANTE A MAMOPLASTIA DE AUMENTO:  
RELATO DE EXPERIÊNCIA DA PRÁTICA CLÍNICA**

*Júlia De Oliveira Freitas E Silva (freitas.juu@gmail.com)*

*Andréia Edwirges De São Carlos Amorim Mourão De Araújo Ramos  
(andreapersa@hotmail.com)*

*Mayara Marins Santos Da Silva (marinsmayara.ss@gmail.com)*

*Sabrina Dos Santos Rosa (sabrinasdos2013@gmail.com)*

*Suely Lopes De Azevedo (juufreeitas@hotmail.com)*

*Angela Maria E Silva (anjoomaria@gmail.com)*

O Ministério da Saúde recomenda que a amamentação seja exclusiva nos primeiros 6 meses de vida e complementada até 2 anos de idade ou mais. A mamoplastia de aumento é uma condição que pode gerar intercorrências no processo de aleitar, levando ao impacto significativo de insucesso no aleitamento. Objetivo: Relatar experiência de acadêmicos de enfermagem na identificação dos diagnósticos e intervenções de enfermagem relacionados ao processo de aleitar em puérpera com uso de prótese mamária (silicone). Metodologia: Estudo baseado no relato de experiência de acadêmicos de enfermagem cujo foco é a descrição no manejo clínico da amamentação com mulher portadora de prótese mamária. O estudo ocorreu em dois dias de prática clínica no alojamento conjunto de uma Maternidade Escola do Rio de

Janeiro em abril 2017. Utilizou-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem como estratégia de ensino durante a prática de enfermagem com utilização das Classificações Internacionais NANDA e NIC como referencial. Resultados: Diagnostico de Enfermagem elencados: Leite materno insuficiente, Ansiedade, Risco de integridade da pele prejudicada, Risco processo de criação de filho ineficaz, Risco de glicemia instável do RN, Risco de tensão do papel de cuidador, Disposição para amamentação melhorada. Intervenções de Enfermagem implementadas foram: aconselhamento para a lactação, orientação à mãe do lactente, promoção de vínculo, melhora do enfrentamento e controle da hipoglicemia do lactente. Conclusão: A mamoplastia de aumento e ansiedade materna refletiram na eficácia da amamentação. Os resultados após avaliação, julgamento clínico e intervenções possibilitaram individualizar a assistência e melhorar a capacidade de amamentar. Contribuições: O uso de linguagem padronizada para planejar o cuidado possibilitou aos discentes o raciocínio clínico e habilidades para realizar cuidados de qualidade e individualizado. Discutir e refletir sobre um tema de relevância como a amamentação no ensino contribui para correlacionar a teoria e aprimorar a habilidades práticas.