MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DE AÇÕES OU SERVIÇOS EM MOTRICIDADE OROFACIAL - MOTRICIDADE OROFACIAL

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, TESTE DA LINGUINHA, FRENOTOMIA, FRENECTOMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Danielle Pereira De Lima (fgadanielle@gmail.com)

Paula Fernanda Rocha De Assis Santana (paularocha82@hotmail.com)

Pablo Vinícius Do Nascimento Pinto (pablovinicius donp@gmail.com)

Águida Alves Pereira (aguida.alves02@gmail.com)

Rômulo César De Alencar (Dr.romulocesar@gmail.com)

Midiane Gomes Da Silva (midianegsilva@hotmail.com)

Ana Paula Alves Figueiredo Lima (ana.aflima@ufpe.br)

Aline Natallia Simões De Almeida (aline.natallia@ufpe.br)

Mariana De Carvalho Leal Gouveia (mariana.gouveia@ufpe.br)

Hilton Justino Da Silva (hilton.islva@ufpe.br)

INTRODUÇÃO: A anquiloglossia, conhecida como frênulo lingual alterado, é uma anomalia congênita do frênulo que se apresenta encurtado ou anteriorizado, pois ocorre a permanência de um tecido embrionário, que não

sofreu apoptose durante o desenvolvimento, podendo prejudicar as funções do sistema estomatognático como mastigação, deglutição, sucção, respiração e fala. Para o tratamento são indicadas a Frenotomia ou Frenectomia para a correção cirúrgica e reabilitação das funções estomatognáticas alteradas. OBJETIVOS: Relatar os serviços de extensão universitária em parceria da fonoaudiologia e odontologia para a avaliação da anquiloglossia e oferta de tratamento. SERVIÇO PROPONENTE: Laboratório Integrado de Motricidade Orofacial (LABIMO) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com atuação de fonoaudiólogos e cirurgião dentistas. O LABIMO está inserido no departamento de Fonoaudiologia da UFPE, que cumpre assistência à população pelo SUS. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Os projetos Língua Solta e Teste da Linguinha atendem em demanda espontânea, desde 2014, quando ocorreu a obrigatoriedade do teste da linguinha no Brasil pela lei nº Lei 13.002/ 2014. O projeto prioriza os bebês devido à proteção do aleitamento materno, a queixa predominante das mães é a dificuldade na amamentação. O fonoaudiólogo realiza a avaliação do frênulo lingual utilizando o protocolo de Martinelli (Martinelli 2014), e o protocolo de Marchesan em crianças acima de 3 anos de idade (Marchesan 2010). Em seguida, o cirurgião dentista realiza o procedimento cirúrgico e o fonoaudiólogo auxilia o cirurgião dentista fazendo a manobra na elevação da língua, facilitando a realização do procedimento. Por fim, o fonoaudiólogo atua após o procedimento com orientação para as mães sobre a amamentação. As mães atendidas neste serviço retornam com uma semana para reavaliação cirúrgica e da amamentação e relatam melhora na amamentação, aumento da elevação da língua durante o choro e intervalos maiores entre as mamadas, facilitando a continuidade do aleitamento materno. Nas crianças maiores os pais referem uma melhor produção da fala. Um dos nossos maiores desafios é atender a demanda com qualidade, afinal a extensão universitária é de cunho social e é uma forma de oferecermos a sociedade um serviço que possibilita o compartilhamento do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. Os projetos de extensão Língua Solta e Teste da Linguinha realizam uma média de 250 atendimentos por ano, realizando a intervenção cirúrgica, quando necessário. No caso da amamentação no seio materno exclusivo, o leite agirá na cicatrização e ajudará na movimentação correta da língua. Caso a criança não faça uso do leite

materno, deve-se optar por alimentos gelados e de fácil ingestão para auxiliar na cicatrização e evitar movimentação excessiva da língua. O profissional de fonoaudiologia atua também identificando pacientes que necessitam de acompanhamento para reabilitação das funções estomatognáticas, incluindo a fala. CONCLUSÃO: Os projetos Língua Solta e Teste da Linguinha são compostos por uma equipe transdisciplinar, estudantes e profissionais da área de fonoaudiologia e odontologia atuando de forma integrada, auxiliando no diagnóstico e intervenção de bebês e crianças que favorecem a manutenção de uma amamentação no seio materno e também no ajuste das funções rinoestomatoglossognáticas.