PÔSTER ELETRÔNICO - AVANÇOS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E NEONATAL

PREVALÊNCIA DE PARTO VAGINAL VERSUS CESÁREA ENTRE OS ANOS DE 2004 E 2014

Glaice Dias (glaicedias@gmail.com)

Cristiane Teixeira Da Silva Vicente (cvicente.enf@gmail.com)

Juliana Cardoso (julianaodcardoso@gmail.com)

Pamela Bento Dos Santos (pamelasantos.rj@hotmail.com)

Letycia Das Chagas Castro (bitine@ig.com.br)

Objetivo: O presente estudo buscou identificar a prevalência dos tipos de parto nos anos 2004 e 2014 na região de saúde Baixada Litorânea situada no Rio de Janeiro, tendo como base um período de dez anos, relacionando com as características presentes da sociedade e da mulher acerca do parto através da busca pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Método: Pesquisa descritiva documental com abordagem quantitativa realizada nos meses de maio a junho de 2016 através do DATASUS. Foram selecionadas as váriaveis: parto vaginal 2004, parto vaginal 2014, parto cesário 2004 e parto cesário 2014 e utilizados os dados referentes a região de saúde Baixada Litorânea no Estado do Rio de Janeiro. Resultados: Destacamos que prevalência de parto vaginal foi identificada no ano de 2004, no ano de 2014 o parto cesário foi o mais prevalente na Baixada Litorânea. O município com a maior média de partos vaginal e cesário nos anos de 2004 e 2014 foi Cabo Frio. Apesar da menor média de partos ocorrer em ambos os anos no

município de Iguaba Grande, houve um aumento na média de partos cesáreo neste no ano 2014. Conclusão: O aumento na prevalência de parto cesáreos na região da Baixada Litorânea após uma década demonstram que o perfil das mulheres e do acesso a informação tem se alterado constantemente. Este estudo nos leva a pensar na necessidade de novas pesquisas estratégicas que visem identificar os fatores associados a opção pela escolha do parto cesáreo nesta região e o impacto na vida das mulheres, para oferecer a mulher e seu bebê a melhor assistência com o menor risco a vida.