

RESUMO SIMPLES - SAÚDE BUCAL

ADMISSÃO NA EMERGÊNCIA: DIAGNÓSTICO DOS PRINCIPAIS TRAUMATISMOS DENTO-ALVEOLARES – REVISÃO DE LITERATURA

Rafael Miranda Araújo (rafamirandaaraujo301@gmail.com)

Ariana Sousa Vieira Silva (arianavieira2011@gmail.com)

Marcos Vinnycius (mv.azarias@gmail.com)

Eliabe Soares De Godoi (eliabe.godoi@hotmail.com)

*Stéfane Karolyne De Paiva Francisco Neto
(stefanekarolyne.odonto@gmail.com)*

Uander De Castro Oliveira (uanderoliveira2011@gmail.com)

Lhoreny Silva Santos (lhoreny_lolo@hotmail.com)

Introdução: As lesões dento-alveolares são habitualmente caracterizadas por envolver dentes, tecidos moles e de suporte periodontal e os ossos da face; a principal faixa etária mais acometida são aparentemente adolescentes e crianças, porém adultos também estão sujeitos a se envolver com esses traumas. Seus pretextos são variados, as mais predominantes para esses tipos de lesões odontológicas são as quedas da mesma altura, os acidentes automobilísticos, violências urbanas, armas de fogo, lutas livres e práticas de esporte em geral. **Objetivo:** O vigente trabalho evidencia os diagnósticos para mais recorrentes traumatismos dento-alveolares, com o intuito de elucidar tais afirmativas de cunho emergencial através de uma revisão literária. **Metodologia:** O atual estudo consiste na realização de uma revisão literária

precedendo buscas nos bancos de dados do PubMed, MEDLINE, LILACS e SciELO. Aplicando os seguintes termos chaves: “Traumas dentários”, “Fraturas odontológicas”. Foram eleitos 10 artigos para a elaboração deste estudo, com critério de exclusão para aqueles publicados anteriormente ao ano de 2020 e os que não condiz com o assunto proposto. Resultados: Traumatismos dento-alveolares são comumente observados em consonância com traumas faciais, sendo o aparelho estomatognático pré-disposto a ser comprometido. As lesões mais rotineiras em estruturas de suporte são as avulsões se caracterizando pela exarticulação do dente de seu alvéolo; a luxação intrusiva apresentada pelo deslocamento do elemento dentário para dentro do alvéolo; a luxação extrusiva sendo o deslocamento de uma porção do dente para exterior do alvéolo; a luxação lateral determinada pelo traumatismo de maior energia que leva o deslocamento dentário em várias direções, mesial, vestibular, distal ou palatino; concussão descrita com traumatismo de baixa energia aos tecidos de suporte/sustentação, porém com ausência de ruptura de fibras. Não há mobilidade e/ou deslocamento do elemento dentário; subluxação definida com traumatismo de moderada a baixa energia nos tecidos, o dente pode mostrar mobilidade, porém não está deslocado do alvéolo. Conclusão: Indubitavelmente, que o diagnóstico correto desses traumas dento-alveolares, são de intensa relevância para uma condução e intervenção adequada e individualizada.