

RESUMO SIMPLES - OUTRAS

MANUTENÇÃO COM ACESSO VENOSO PERIFÉRICO : UM ESTUDO DE REVISÃO

Leilyanne De Araújo Mendes Oliveira (leimendes@hotmail.com)

Samara Maria Leal De Moura (samara.moura@ebserh.gov.br)

Mila Garcia De Mello Souza Oliveira (milagmello21@gmail.com)

Carmen Celia Neves De Souza (carmen.souza@ebserh.gov.br)

Maisa De Carvalho Francisco (maisa.francisco@ebserh.gov.br)

INTRODUÇÃO: O acesso venoso periférico é um dispositivo invasivo utilizado para a assistência de pacientes internados que necessitam de algum tipo de terapia intravenosa. Esse dispositivo é o mais empregado, e, quando manuseado de forma inadequada, pode gerar o desenvolvimento de complicações como: flebite, obstrução, infiltração, lesão mecânica e remoção acidental. Dentro do ambiente hospitalar a inserção dos cateteres intravenosos periféricos é amplamente realizada. A recomendação para o uso dos cateteres flexíveis proporciona uma adaptação melhor em relação à anatomia da rede venosa, gerando menor risco de complicações locais por lesão mecânica no sítio de inserção. **OBJETIVO:** Descrever os cuidados e manutenção com o cateter venoso periférico durante a internação. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa realizada na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com o período da pesquisa dos artigos entre 2016 a 2022. **RESULTADOS:** Os cuidados com a manutenção do cateter venoso periférico devem ser iniciados desde sua inserção na escolha do local para a

sua inserção. Destaca-se o antebraço esquerdo (23,8%) como melhor escolha, seguido pelo braço direito (18,0%) e braço esquerdo (16,5%). Os locais menos frequentes foram o dorso da mão direita (10,3%) e a esquerda (13,5%).

CONCLUSÃO: Através desse estudo foi possível identificar os cuidados com a manutenção do cateter venoso periférico e os métodos mais eficazes que permitem reduzir os riscos de infecções e assim aprimorar a técnica e melhorar as fragilidades que podem surgir durante a sua inserção permitindo assim estratégias focadas nas necessidades do paciente, objetivando melhorar o cuidado prestado.