

RESUMO SIMPLES - SAÚDE DA MULHER

PREVALÊNCIA DE UROPATÓGENOS E COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS À INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO NA GRAVIDEZ

Mayara Da Silva Falcão (mayasilvafalcao@gmail.com)

Claudiana De Lourdes Guilherme Gomes (claudianaggomes@gmail.com)

INTRODUÇÃO: A Infecção do Trato Urinário (ITU) é uma enfermidade incidente em todo o mundo e pode acometer pessoas de todas as idades, com grande incidência em mulheres e grávidas. Dadas as mudanças fisiológicas e anatômicas do período gestacional, essa doença se torna frequente e associa-se a algumas complicações que afetam a saúde materna e fetal. Dentre as várias causas de ITU, as bactérias são os uropatógenos mais prevalentes identificados laboratorialmente pelos exames de Elementos Anormais e Sedimentoscopia (EAS) e urocultura. **OBJETIVO:** Verificar a prevalência de uropatógenos e as complicações associadas à ITU na gravidez. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo revisão integrativa da literatura, como base nos trabalhos encontrados nos bancos de dados, Portal de Periódicos CAPES, PubMed e Scielo, cruzando os descritores “Gravidez”, “Infecção”, “Sistema Urinário”, “Bactérias” e “Complicações na Gravidez”. Como critério de inclusão foram selecionados artigos publicados entre 2019 e 2023, nos idiomas português e inglês com disponibilidade de textos completos. **RESULTADOS:** Foram encontrados 128 e apenas 16 artigos se enquadraram nos requisitos da pesquisa. Verificou-se nestes trabalhos que as ITU em gestantes são originadas principalmente por *Klebsiella* sp. em 100% dos artigos, sendo a *K. pneumoniae* a mais incidente, sucessivamente a

Escherichia coli em 93,75%, Staphylococcus aureus 50%, Streptococcus sp. 50% e Proteus sp. 50%. Além disso, os autores dos trabalhos elencaram, principalmente, complicações como o trabalho de parto prematuro, distúrbios hipertensivos da gravidez e abortos espontâneos. Ademais, quando não tratada a ITU pode ascender e progredir para casos de sepse. Assim, torna-se imprescindível o adequado diagnóstico assim como o tratamento imediato com antibióticos

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, a alta incidência de Infecções do Trato Urinário em gestantes causadas, principalmente, por Klebsiella sp. e Escherichia coli requer um diagnóstico precoce e tratamento adequado para que sejam minimizados os risco de complicações à saúde materna e fetal.