

RESUMO SIMPLES - SAÚDE PÚBLICA

HANSENÍASE: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS NO TOCANTINS EM 2023

Heloísa Silva Costa (helosc29@gmail.com)

Introdução: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa bacteriana provocada pelo *Mycobacterium leprae*, responsável por danos em nervos periféricos que cursa com lesões de pele e perda da sensibilidade. A patologia é considerada endêmica no Brasil e a região norte possui uma das maiores taxas de prevalências. Logo, tendo em vista a localização do estado do Tocantins, surge a necessidade de investigar o perfil epidemiológico dos indivíduos que já foram diagnosticados em 2023, a fim de salientar medidas de prevenção e rastreio direcionadas ao público-alvo. **Objetivos:** delimitar o perfil epidemiológico da hanseníase entre os casos diagnosticados no Tocantins em 2023. **Metodologia:** O levantamento de dados foi obtido por meio do DATASUS – Doenças e Agravos de Notificação (SINAN). Trata-se de um estudo ecológico de caráter quantitativo direcionado à análise de características como sexo, raça e faixa etária (aprupados em 0 a 19 anos, 20 a 39, 40 a 59 e acima de 60 anos de idade) de prevalência da doença. Foram excluídos do estudo a sessão ignorado/exterior. **Resultados:** De acordo com o SINAN, já foram diagnosticados 285 casos de hanseníase no estado do Tocantins no presente ano, dentre estes, a maioria (59%) são do sexo masculino. Além disso, no que se refere à raça, a cor parda foi a que se mais destacou, correspondendo a 186 (65%) dos casos, seguida da cor preta, com 49 (17%), e branca, com 25 (8%). Por fim, foi analisada a faixa etária, obtendo os seguintes valores: 33 casos

entre 0 e 19 anos (11,5%); 67 entre 20 e 39 anos (23,5%); 113 entre 40 e 59 anos (40%); e 72 casos de indivíduos acima de 60 anos (25%). Portanto, torna-se evidente um perfil de maioria homens, de cor parda e acima de quarenta anos. Conclusões: Os dados coletados permitiram observar características predominantes dos indivíduos diagnosticados no ano de 2023 e, a partir disso, torna-se importante utilizar políticas de rastreamento voltadas para este público, a fim de direcionar a atenção primária e poder acompanhar desde a fase precoce da doença.