

## **RETALHO DE PADRÃO AXIAL DA PREGA INGUINAL EM FELINO DOMÉSTICO POR DEFEITO CIRÚRGICO DE MASTECTOMIA – RELATO DE CASO**

Nikolas Gabriel Costa OLIVEIRA<sup>1</sup>; Izadora de Souza PIRES<sup>1</sup>; Monalisa Correia de MORAIS<sup>2</sup>

**Palavras-chave:** Cirurgia reconstrutiva, retalhos cirúrgicos, gata.

A hiperplasia mamária felina é uma enfermidade não neoplásica frequentemente observada em gatas, caracterizada pela rápida hipertrofia e hiperplasia das glândulas mamárias, envolvendo a proliferação do estroma e epitélio ductal. Este distúrbio acomete principalmente fêmeas jovens, não castradas, em fase de diestro, e submetidas ao uso de injeções sob a forma de medicações contraceptivas. O presente trabalho objetiva relatar o caso de um felino atendido com hiperplasia e neoplasia mamária, sendo submetido à cirurgia de ovariohisterectomia e mastectomia, necessitando de retalho como forma de tratamento para correção do grande defeito cutâneo gerado. Um felino, fêmea, SRD, 12 anos de idade, pesando 3,8 kg, foi atendida com hiperplasia mamária e um nódulo na mama inguinal direita de aproximadamente oito centímetros. Na condição, após a avaliação clínico cirúrgica e planejamento da técnica, a paciente foi encaminhada para cirurgia após realizar os exames pré-cirúrgicos, e estes estarem dentro da normalidade e de estadiamento da neoplasia que não evidenciou nenhuma alteração digna de nota. O procedimento cirúrgico incluiu inicialmente a realização de ovariohisterectomia, seguida pela mastectomia unilateral total direita. Para corrigir o defeito causado na pele pela exérese do tumor, foi realizado delimitação e incisão do retalho da prega inguinal, divulsão da pele e, à altura da aponeurose do músculo reto abdominal externo, realizou-se as suturas no tecido subcutâneo com fio poliglactina 3-0, padrão intradérmico e dermorrafia com fio náilon 3-0, padrão simples separado. No retorno pós-operatório com vinte e um dias, a paciente estava clinicamente estável e a ferida cirúrgica exibia uma excelente cicatrização. Diante disso, conclui-se que cirurgias reconstrutivas de retalho padrão axial da prega inguinal apresentam grande importância em casos de reparo causado pela exérese do tumor na mama inguinal, corrigindo o defeito causado pelo procedimento de mastectomia relatado, garantindo uma recuperação pós-operatória favorável e um resultado estético satisfatório

<sup>1</sup>Graduado do Curso de Medicina Veterinária, Centro Universitário Leão Sampaio. Email para correspondência: [nikolasgabrielcosta3@gmail.com](mailto:nikolasgabrielcosta3@gmail.com)

<sup>2</sup>Médica Veterinária pelo Centro Universitário Leão Sampaio, Juazeiro do Norte.