

**RESUMO - APRESENTAÇÃO NA MODALIDADE E-PÔSTER - ENSINO E
PESQUISA EM REABILITAÇÃO**

**INTERVENÇÕES DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE
REABILITAÇÃO EM PACIENTES COM DEGLUTIÇÃO COMPROMETIDA:
UMA SCOPING REVIEW**

Maria Salomé Martins Ferreira (salomeferreira@ess.ipvc.pt)

Vasco Sousa (enfvascosousa@outlook.pt)

Ana Isabel Natário (smartimferreira@gmail.com)

Teresa Moreira (tmoreira@ufp.edu.pt)

Arminda Vieira (armindavieira@ess.ipvc.pt)

Andreia Maria Novo Lima (amarialima@ess.ipvc.pt)

Introdução: A deglutição é fundamental na nutrição e na proteção da via aérea. É um processo dinâmico e complexo, composto por fases intrinsecamente relacionadas e sequenciais. Na disfagia há um compromisso da normal passagem do bolo alimentar e esta possui elevada prevalência em adultos institucionalizados e, é associada a patologias neurológicas e da cabeça e pescoço. O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação (EEER) detém o conhecimento e competências necessárias para intervir eficazmente nesta problemática.

Objetivos: Mapear a evidência científica, mais atualizada, sobre a intervenção do Enfermeiro Especialista em Reabilitação (EEER) em pacientes com deglutição comprometida, em contexto hospitalar; Identificar intervenções do

EEER em adultos com deglutição comprometida, em contexto hospitalar; Descrever as intervenções do EEER identificadas no paciente adulto com deglutição comprometida, em contexto hospitalar.

Metodologia: Foi realizado um estudo de revisão do tipo Scoping Review segundo a metodologia JBI, obedecendo a critérios de elegibilidade com base na População, Conceito e Contexto. A pesquisa foi concretizada nas bases de dados MEDLINE, CINAHL, Cochrane Database, Scopus, Scielo, PubMed, RCAAP e RENATES, aplicando a frase booleana definida. Foram incluídos dez estudos: quatro estudos de caso, três estudos quantitativos, duas revisões sistemáticas da literatura e um estudo controlado randomizado.

Resultados: A análise dos dez estudos permitiu identificar a avaliação da deglutição prévia à administração de alimentos por via oral, a implementação de estratégias compensatórias (modificação de dieta, higiene oral, técnicas posturais compensatórias e técnicas facilitadoras da deglutição) e estratégias de reabilitação (reabilitação funcional motora e reabilitação funcional respiratória), a intervenção psicológica e a educação para a saúde como intervenções do EEER no paciente com disfagia em contexto hospitalar.

Discussão: esta scoping review permitiu aferir a importância da intervenção do EEER, em pacientes com deglutição comprometida em contexto hospitalar, sobressaindo que a intervenção do EEER se divide em duas fases: numa primeira fase, a avaliação da deglutição e a identificação precoce da disfagia e, numa segunda etapa a elaboração de um programa de intervenção do EEER personalizado.

Conclusão: O EEER é fundamental na promoção da funcionalidade, independência e na qualidade de vida do paciente com disfagia.

Palavras-chave: palavras-chave: deglutição; disfagia; enfermagem de reabilitação.