

I CONGRESSO REGIONAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS E INOVAÇÃO

ETIOLOGIA DA PERDA AUDITIVA EM ADULTOS

Camilla Maganhin Luquetti; Eduardo Brasil de Souza; Marisol Rabelo de Almeida; Bárbara dos Santos Tayt-Sohn; Alexandre Neves Reis Araújo e Silva; Natália da Cruz Barbosa; Karine Maria Fonseca da Silva; Jesus Francisco Lopes Júnior; Daniel Feres Braga; Maria Vitória Bugallo Toth.

Introdução: Perda auditiva é um problema comum que todos vivenciam de tempos em tempos. A audição diminuída também pode ocorrer durante uma infecção de ouvido. **Objetivo:** discutir a etiologia da perda auditiva em adultos. **Metodologia:** Revisão de literatura a partir de bases de dados da Scielo, da PubMed e da BVS, de janeiro a abril de 2024, com descritores “Etiology”, “Hearing Loss” e “Adults”. Incluíram-se artigos de 2019-2024 (total 90), com exclusão de outros critérios e escolha de 05 artigos na íntegra. **Resultados e Discussão:** A perda auditiva é uma deficiência crônica comum, particularmente em adultos mais velhos. Na coorte Beaver Dam nos Estados Unidos, a prevalência de perda auditiva, definida pela audiometria, aumentou de forma constante com a idade. por cento com idades entre 21 e 34 anos; 6 por cento com idades entre 35 e 44 anos; 11 por cento com idades entre 44 e 54 anos; 25 por cento com idades entre 55 e 64 anos; 43 por cento têm entre 65 e 84 anos. Em todo o mundo, as estimativas da Organização Mundial de Saúde indicam que a perda auditiva afeta 538 milhões de pessoas. Todas as causas de perda auditiva do ouvido externo e médio resultam em perda auditiva condutiva; quase todas as causas do ouvido interno resultam em perda auditiva neurossensorial. As causas menos comuns de perda auditiva incluem: Uma doença autoimune (uma doença que pode levar o sistema imunológico do seu corpo a atacar os próprios tecidos); defeitos congênitos; certos medicamentos que lesam os ouvidos como efeitos colaterais; lesões ao ouvido; tumores dentro do ouvido ou em partes do cérebro. Podemos ter ainda, a perda auditiva é frequentemente associada ao avanço da idade, mas isso nem sempre é o caso. Embora possa atingir pessoas de qualquer idade, a condição aparece mais frequentemente após os 65 anos de idade. **Conclusão:** A perda de audição leve pode ser tratada com aparelhos auditivos para melhorar a qualidade de vida e facilitar a comunicação com outras pessoas. O tratamento pode também ajudar a prevenir a progressão da perda auditiva.

Palavras-chave: Etiologia; Perda Auditiva; Adultos.