

I CONGRESSO REGIONAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS E INOVAÇÃO

LESÕES PIGMENTADAS BENIGNAS DA PELE, EXCETO NEVOS MELANOCÍTICOS

Camilla Maganhin Luquetti; Mirian Paolo Ribeiro; Eduardo Brasil de Souza; Marisol Rabelo de Almeida; Bárbara dos Santos Tayt-Sohn; Gustavo Roque de Queiroz; Júlia Berteli Nunes; Victor Emílio Vargas Barzota; Alexandre Neves Reis Araújo e Silva; Daniel Feres Braga; Gabriela Ludmyla Pereira Marques.

Introdução: Trata-se de um tipo de lesão cutânea benigna que surge devido à proliferação de melanócitos, as células responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele.

Objetivo: discutir as lesões pigmentadas benignas da pele, exceto nevus melanocíticos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa a partir de artigos publicados nas bases científicas de dados da Scielo, da PubMed e da BVS. A busca dos artigos ocorreu no período de março a maio de 2024, utilizando-se dos descritores em inglês “Benign pigmented lesions of the skin” e “Melanocytic Nevus” e seus correspondentes em português. Foram incluídos artigos completos e publicados nos últimos cinco anos (2019 a 2024), com um total de 27 estudos. Após leitura dos títulos e resumos, excluíram-se estudos que não atendiam aos critérios estabelecidos, seguida por posterior escolha de 05 artigos para leitura na íntegra. **Resultados e Discussão:** Lentigos são máculas pigmentadas, benignas e persistentes (geralmente <5 mm de diâmetro) que resultam do aumento da produção de pigmentos pelos melanócitos epidérmicos. Máculas café-com-leite são lesões pigmentadas planas, de cor bronzeada a marrom-escura, que podem estar presentes no nascimento ou aparecer durante a primeira infância. O nevo de Becker é um hamartoma cutâneo benigno com elementos epidérmicos ou dérmicos. Melanocitoses dérmicas: melanocitose dérmica congênita (manchas mongólicas) geralmente aparece como manchas pigmentadas, azul-acinzentadas, congênitas, com bordas mal definidas; nevo de Ota envolve principalmente as áreas da pele inervadas pela primeira e segunda divisões do nervo trigêmeo. e o nevo de Ito assemelha-se ao nevo de Ota clínica e histopatologicamente, mas envolve as áreas da pele inervadas pelos nervos supraclavicular posterior e braquiocutâneo lateral. **Conclusão:** Lesões pigmentadas benignas da pele e nevus melanocíticos (pintas) são comuns em crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Lesões pigmentadas benignas da pele; Nevus Melanocíticos.