

## RESUMO SIMPLES - 6. ONCOLOGIA CLÍNICA

### **ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS INTERNAÇÕES POR NEOPLASIA DE LARINGE NO ESTADO DO PARÁ ENTRE 2019 E 2023.**

*Suzana Gomes De Oliveira (suzanagomesoliv@gmail.com)*

*Luigi Chermont Berni (luigi.berni@aluno.uepa.br)*

*Lorena Evelyn Cordovil Dos Santos (lorena.ecdsantos@aluno.uepa.br)*

*Cecília Harumi Martins Hatano (ceciliahatano@gmail.com)*

*Giovana Pereira Lobato Brito (govanaplbrito@gmail.com)*

*Rita De Cassia Silva De Oliveira (rita.oliveira@uepa.br)*

**Introdução:** A neoplasia maligna de laringe representa cerca de 25% das neoplasias malignas de cabeça e pescoço, manifestando-se com rouquidão, dispneia, sensação de corpo estranho, odinofagia e otalgia reflexa. Embora o câncer de laringe seja curável quando diagnosticado precocemente, a maioria dos pacientes é diagnosticada em estágios avançados, resultando em maior morbidade, mortalidade e internações. Portanto, é crucial avaliar as variáveis associadas a essas internações. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico das internações por neoplasia de laringe no estado do Pará entre 2019 e 2023. **Materiais e Métodos:** Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, quantitativo, observacional. Foram analisados dados sobre internações por neoplasia de laringe no período de 2019 a 2023, considerando faixa etária, cor/raça, sexo e prevalência entre os municípios do Pará. As informações foram extraídas do DATASUS, através do TabNet, que reúne dados do Sistema

Único de Saúde (SUS). Resultados: No período analisado, ocorreram 632 internações, com uma taxa média de variação de 2,66%. O maior crescimento foi observado de 2019 a 2020 (16,1%). A maioria dos pacientes era do sexo masculino (86,86%) e de raça/cor parda (89,08%). Os grupos etários predominantes foram de 60 a 69 anos (35,6%) e 70 a 79 anos (25,31%). O município de Belém apresentou o maior número de internações (n=446/70,56%), seguido por Santarém (n=99/15,66%). Conclusão: A análise indica um padrão estável de internações por neoplasia de laringe, com predominância entre homens e idosos. A concentração de casos em Belém destaca a necessidade de estratégias de diagnóstico precoce e prevenção, fundamentais para melhorar o manejo dos pacientes e reduzir os impactos negativos dessa doença na saúde pública.

Palavras-chave: epidemiologia; pará; laringe; neoplasia.