

## RESUMO SIMPLES - 2. CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS

### **RELATO DE EXPERIÊNCIA DE CONFECÇÃO DE ÓRTESES DE DESCOMPRESSÃO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS ASSISTIDOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA**

*Kharinni Uchôa Pereira (khaup@hotmail.com)*

*Thamires Da Fonseca De Souza Sarraff (thami.souza11@gmail.com)*

Introdução: A lesão por pressão (LP) é um problema com alta incidência em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), devido situações como: alteração do nível de consciência, uso de suporte ventilatório, sedativos, drogas vasoativas, imobilismo e instabilidade hemodinâmica, agravando-se em condições oncológicas de tendência ao emagrecimento, anorexia e fadiga muscular. Nesse contexto, o terapeuta ocupacional atua na prevenção das LP's confeccionando e prescrevendo órteses de descompressão para alívio de sobrecarga tissular. Objetivo: Descrever a operacionalização da prática do terapeuta ocupacional na prevenção de LP de pacientes oncológicos em UTI's do Hospital Ophir Loyola. Relato de caso: A crescente solicitação de confecção de órteses de descompressão nas UTI's desse hospital remete ao período pandêmico, passando o terapeuta ocupacional de atendimentos por interconsultas à integrar a equipe em duas UTI's de longa permanência. Este profissional realiza a avaliação antropométrica, prescreve, confecciona, posiciona, orienta e treina a equipe quanto ao uso. As órteses de descompressão são confeccionadas no laboratório de Tecnologia Assistiva do hospital, com colchão caixa de ovo, densidade D28. Estas distribuem o peso do

segmento corpóreo de modo a diminuir a pressão local e auxiliam no posicionamento adequado para prevenir deformidades. As regiões occipital, sacral e calcânea são mais propensas a devolver as LPs em pacientes intubados, motivo esse de adoção da prática de órteses preventivas para essas regiões, mesmo havendo pele íntegra e sem hiperemia. Também são confeccionados outros modelos, como para o membro superior completo e rolos para região costal para auxiliar nas mudanças de decúbito e lateralização. Conclusão: Conclui-se que a adoção das órteses de descompressão vêm auxiliando na prevenção e auxiliando no tratamento das LP's dos pacientes oncológicos em UTI's desse hospital e que o baixo custo e boa performance são bons indicativos de recomendação para mais investimentos da matéria prima necessária ao pleno efetivo desse serviço.

Palavras-chave: paciente oncológico; unidade de terapia intensiva; lesão por pressão; terapia ocupacional; órteses de descompressão.