

RESUMO SIMPLES - 6. ONCOLOGIA CLÍNICA

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO ASSOCIADO À INFECÇÃO PELO HPV, ATENDIDO EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA ONCOLÓGICA NA METROPOLITANA DE BELÉM NO PERÍODO ENTRE 2011 A 2015

*Claudia Nazaré De Souza Almeida Titan Martins
(claudiatitanmed@yahoo.com.br)*

Nelson Veiga Gonçalves (nelsoncg2009@gmail.com)

Claudia Do Socorro Carvalho Miranda (cllaumiranda@gmail.com)

Ismari Perini (ismaripf@hotmail.com)

Luciene Dias Cavalcante (lucavalcante.bibl@gmail.com)

Lucrecia Aline Cabral Formigosa (lacformigosa@gmail.com)

O controle do câncer de colo do útero (CCU) é uma das prioridades nas políticas públicas de saúde no Brasil, devido à sua elevada incidência, morbidade e mortalidade. O objetivo do estudo foi analisar a distribuição espacial e temporal da incidência de casos de CCU associados à infecção pelo HPV na Região Metropolitana de Belém, em pacientes atendidos em um CACON. Trata-se de um estudo descritivo transversal, de natureza retrospectiva, com abordagem quantitativa e ecológica de base populacional, aprovado eticamente (1.963.978). Foram utilizados dados do Registro Hospitalar de Câncer do Hospital Ophir Loyola-PA, abrangendo o período de 2011 a 2015, com análise de 542 prontuários e exames citopatológicos de

mulheres. A análise espacial revelou que, em 2011, os municípios de Castanhal, Belém, Marituba, Santa Izabel, Ananindeua e Benevides apresentaram as maiores taxas de incidência. Em relação às características socioeconômicas, a maioria dos casos em Belém (52,96%) ocorreu em mulheres com idades entre 40 e 60 anos, sendo que 56,4% possuíam ensino fundamental completo. A cor de pele mais prevalente foi a parda (81,6%) em Belém, enquanto em Castanhal, a maioria se autodeclarou preta (42,3%). Em Benevides, 50% eram trabalhadoras informais. Quanto ao estado conjugal, 51,5% declararam-se casadas ou em união consensual. Entre os fatores de risco, 62,5% afirmaram ser ex-consumidores de álcool, 49,5% eram ex-fumantes e 43,36% tinham histórico familiar. O principal tipo histológico encontrado foi o carcinoma epidermóide, indicando que o diagnóstico tardio resulta em alta incidência desse tipo de carcinoma, associado à infecção pelo HPV, corroborando a literatura que aponta 85% dos casos relacionados ao vírus. Além disso, observou-se um aumento percentual de casos desse carcinoma nas classificações de Papanicolau durante quase todos os anos.

Palavras-chave: palavras-chaves: saúde da mulher; geoprocessamento; infecção viral; neoplasia cervical.